

## DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

### KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ SPORTOVCŮ

#### 1. Piezogenní papuly vyšetřujeme nejlépe:

- a) v leže
- b) ve stoji na jedné noze
- c) poloha pacienta nehraje roli
- d) dermatoskopem

#### 2. Nehet sportovců:

- a) je synonymum pro unguis incarnatus
- b) prevencí je zastřížení nehtu na krátko a spíše rovně
- c) patří k diferenciální diagnostice maligního melanomu
- d) diagnózu jednoznačně potvrzuje Hutchinsonovo znamení

#### 3. Černé paty („black heels“):

- a) je synonymum pro tinea nigra
- b) se nacházejí většinou na plosce v oblasti paty
- c) patří k diferenciální diagnostice maligního melanomu
- d) se vykytují především u plavců

#### 4. Acne mechanica:

- a) v léčbě jsou doporučovány lokální retinoidy
- b) v léčbě jsou doporučována antibiotika celkově
- c) progres v acne keloidalis je častější u sportovců světlé pleti
- d) progres v acne keloidalis je častější u sportovců tmavé pleti

#### 5. Traumatický ušní hematom:

- a) je krvácením do kůže a podkoží
- b) je subperichondriálním krvácením
- c) se léčí především konzervativně
- d) je nutné chirurgické ošetření

#### 6. V léčbě omrzlin podle současných poznatků:

- a) je vhodná miniheparinizace
- b) jsou kontraindikována nesteroidní antiflogistika
- c) se doporučuje postupné prohřívání zasažené oblasti
- d) se doporučuje rychlé zahřátí postižené oblasti

#### 7. Mykotické infekce u sportovců:

- a) jsou nejčastěji způsobeny *Trichophyton rubrum*
- b) jsou nejčastěji způsobeny *Trichophyton mentagrophytes*
- c) se vyskytují 2krát častěji než u běžné populace
- d) se vyskytují 4krát častěji než u běžné populace

#### 8. Pseudomonádová folikulitida:

- a) by měla být vždy léčena antibiotiky celkově
- b) má většinou tendenci ke spontánní regresi
- c) nebývá pod plavkami
- d) se objevuje v průměru za 5–7 dní po expozici kontaminované vodě

#### 9. Vhodná antibiotika v léčbě MRSA jsou:

- a) trimethoprim-sulfamethoxazol
- b)  $\beta$ -laktamová ATB
- c) oxacilin
- d) tetracykliny

#### 10. U cvičením vyvolané anafylaxe:

- a) je podání adrenalinu nevhodné
- b) se doporučuje vysadit nesteroidní antiflogistika
- c) profylaktické podání antihistaminik nemá význam
- d) lze preventivně podávat kortikosteroidy celkově

**Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, necht' zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 6/2008:

**Skořepová M.: Tinea capitis**

Správné odpovědi: **1b, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7c, 8a, 9a, 10c**