
DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

M. DARIER A PŘÍBUZNÉ DERMATÓZY

1. **Mutace kalciových ATP-áz byla prokázána v etiopatogeneze:**
 - a) M. Darier a m. Grover
 - b) M. Darier a m. Hailey-Hailey
 - c) M. Hailey-Hailey a m. Grover
 - d) M. Grover a acrokeratosis verruciformis Hopf
2. **Akantolýza u m. Darier a m. Hailey-Hailey:**
 - a) je následkem dysfunkce desmozomů
 - b) je podmíněna autoprotilátkami
 - c) se zhorší při mechanické zátěži kůže
 - d) je potencována působky produkovanými *Staphylococcus aureus*
3. **Predilekční lokalizací u m. Darier jsou:**
 - a) extenzorové plochy končetin
 - b) genitál a sliznice
 - c) seboroické a intertriginózní oblasti
 - d) dlaně a chodidla
4. **K charakteristickými projevům m. Darier patří:**
 - a) kónické papuly s pevně Inoucí keratotickým čepem
 - b) distální zářez tvaru V na nehtové ploténce
 - c) anulární erytematózní ložiska
 - d) ploché papuly barvy kůže na dorzu rukou
5. **Na prvním místě v systémové terapii m. Darier jsou:**
 - a) kortikosteroidy
 - b) metotrexát
 - c) retinoidy
 - d) antibiotika
6. **K charakteristickým projevům m. Hailey-Hailey nepatří:**
 - a) obraz prашné silnice vysychající po dešti ve velkých záhybech
 - b) mokvající plochy s krustoskvamami
 - c) mikroskopicky obraz rozpadající se cihlové zdi
 - d) mikroskopicky přítomnost četných corps ronds
7. **M. Hailey-Hailey si nemůžeme splést s:**
 - a) pemphigus vegetans
 - b) M. Darier
 - c) condylomata acuminata
 - d) lichen sclerosus et atrophicus
8. **M. Grover:**
 - a) nemá nikdy v klinickém obraze puchýřky
 - b) je častější u žen
 - c) je lokalizován především sakrálně a na šíji
 - d) je charakteristický svěděním
9. **V terapii m. Grover a m. Hailey-Hailey:**
 - a) není důležité vyvarovat se pocení
 - b) se mohou uplatnit lokální antibiotika
 - c) se mohou uplatnit celkové retinoidy
 - d) se často využívá metotrexát
10. **O m. Grover neplatí:**
 - a) histologicky může připomínat pemphigus vulgaris
 - b) vždy mizí do několika měsíců
 - c) klinicky může připomínat scabies
 - d) vyskytuje se častěji u hospitalizovaných pacientů

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2), vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 5/2010:

Jirásková M.: Rentgenoterapie – možnosti jejího použití v dermatologii

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3a, 4c, 5c,d, 6a,b, 7a,b,d, 8c, 9c, 10b.