
DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. Odběr vzorku k vyšetření PIF u puchýřnatých chorob se správně provádí z:
 - a) puchýře
 - b) okolí puchýře
 - c) nepostižené kůže
 - d) čerstvého puchýře

2. U pemphigus foliaceus v PIF detekujeme:
 - a) ICS v celé epidermis
 - b) ICS v horní části epidermis
 - c) ICS v celé epidermis a pruh ve stratum granulosum
 - d) ICS v celé epidermis a pruh pod bazální membránou

3. Cílovým antigenem u EBA je
 - a) antigen BP2
 - b) antigen BP2 a laminin332
 - c) kolagen VII
 - d) kolagen IV

4. LABD je onemocnění
 - a) postihující často děti
 - b) s tvorbou IgA autoprotilátek proti kolagenu VII
 - c) s IF nálezem drobných precipitátů IgA v papilách
 - d) které je variantou DHD

5. U bulózního systémového lupusu se tvoří protilátky proti
 - a) lamina lucida bazální membrány
 - b) lamininu 332
 - c) proti NC1 doméně kolagenu IV
 - d) proti NC1 doméně kolagenu VII

6. Pemfigoid slizniční má depozita
 - a) ve stropě puchýře
 - b) ve spodině puchýře
 - c) pod bazální membránou
 - d) ve spodině nebo ve stropě puchýře

7. Fluorescence in situ hybridizace se používá
 - a) při detekci chromozomálních aberací
 - b) při detekci protilátek proti bazální membráně
 - c) ke studiu subpopulací lymfocytů
 - d) k detekci antinukleárních autoprotilátek

8. NaCl rozštěpí bazální membránu v
 - a) v stratum bazale
 - b) v lamina lucida
 - c) v stratum spinosum
 - d) pod lamina densa

9. U vaskulitid odebíráme
 - a) nejlépe rozvinutou morfu
 - b) morfu čerstvou do 24 hodin
 - c) puchýřek
 - d) nejlépe morfu z oblasti kotníků

10. V diagnostice puchýřnatých chorob běžně používáme sadu konjugátů
 - a) anti IgG, IgM, C3, Fb
 - b) anti IgG, IgM, IgA
 - c) anti IgG, IgA, IgM, C3, Fb
 - d) anti IgG, C3

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 3/2011:

Velčevský P.: Pityriasis rubra pilaris

Správné odpovědi: 1.b, 2.b, 3.a, 4.d, 5.d, 6.d, 7.a, c, d, 8. c, 9. b, 10. c