

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. Nejčastější neutrofilní alopecie je:
 - a) Perifolliculitis abscedens et suffodiens
 - b) Acne keloidalis
 - c) Folliculitis decalvans
 - d) Pseudopelade Brocq
2. Biopsie u jizvící alopecie:
 - a) provádíme vždy ze středu alopetického ložiska
 - b) bioptickou jehlu (průbojník) orientujeme kolmo ke kůži
 - c) bioptickou jehlu (průbojník) orientujeme paralelně s vlasovými folikuly
 - d) přímá imunofluorescence se neprovádí
3. Přímá imunofluorescence vykazuje charakteristický nález u:
 - a) lichen planopilaris
 - b) diskoidního lupus erythematoses
 - c) pseudopelade Brocq
 - d) folliculitis decalvans
4. Pro aktivitu jizvící alopecie svědčí pozitivní trakční test z okraje ložiska s:
 - a) anagenními vlasy
 - b) katagenními vlasy
 - c) telogenními vlasy
 - d) trakční test nemá význam
5. Popisovanou komplikací diskoidního lupus erythematoses je:
 - a) maligní melanom
 - b) bazaliom
 - c) spinaliom
 - d) dermatofibrosarkoma protuberans
6. U diskoidního lupus erythematoses jsou první linií celkové léčby:
 - a) retinoidy
 - b) antimalarika
 - c) kortikosteroidy
 - d) metotrexát
7. Frontální jizvící alopecie:
 - a) je onemocněním převážně žen po menopauze
 - b) je onemocněním převážně mladých žen
 - c) se vyskytuje i u mužů
 - d) postihuje výhradně křtici
8. U pseudopelade Brocq:
 - a) je většinou výrazný erytém ložisek
 - b) rozložení ložisek někdy připomíná „stopy ve sněhu“
 - c) bývá provázána vznikem atrofických jizev
 - d) bývá provázána vznikem hypertrofických jizev
9. Folliculitis decalvans:
 - a) je onemocněním vyššího věku
 - b) je provázána vznikem pustul
 - c) postihuje často vousy
 - d) vede často ke vzniku hypertrofických jizev
10. U folliculitis decalvans se v celkové léčbě doporučují:
 - a) antibiotika
 - b) antimalarika
 - c) sulfony
 - d) zinek

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 2/2012:

Fikrle T., Drlík L.: Dermatoskopické vyšetření v neobvyklých indikacích

Správné odpovědi: 1d, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9d, 10c.

*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.