

KONTROLNÍ TEST

- Všeobecně je u granuloma anulare etiopatogeneticky předpokládán:**
 - časný (anafylaktický) typ imunitní reakce na neznámý antigen
 - cytotoxický typ imunitní reakce na neznámý antigen
 - imunokomplexový typ imunitní reakce na neznámý antigen
 - pozdní typ imunitní reakce na neznámý antigen
- Při klasickém histopatologickém nálezů granuloma anulare jsou přítomny:**
 - tuberkuloidní granulomy se sklonem ke kaseifikaci, atrofie epidermis
 - akantóza, ortokeratóza s parakeratózou, střídavá granulóza, pásovité zánětlivé infiltráty
 - degenerovaná kolagenní a elastická vlákna, depozita mucinu, lymfohistiocytární infiltrát
 - Toutonovy obrovské buňky, perivaskulární lymfohistiocytární infiltrát
- Při UVA-1 fototerapii o vlnové délce 340–400 nm jsou jednotlivé dávky v řádu:**
 - desetin J/cm²
 - jednotek J/cm²
 - desítek J/cm²
 - stovek J/cm²
- Polyglutamátové deriváty metotrexátu inhibují enzym:**
 - glukóza-6-fosfát dehydrogenázu
 - thiopurinmethyltransferázu
 - xanthin oxidázu
 - 5-aminoimidazol-4-karboxamid ribonukleotid
- K nejčastějším nežádoucím účinkům terapie dapsonem patří:**
 - retinopatie
 - methemoglobinémie
 - nefropatie
 - koagulopatie
- Tetracykliny jsou:**
 - širokospektrá antibiotika s imunomodulačními účinky
 - vhodné v kombinaci se systémovými retinoidy
 - vhodné v kombinaci s fototerapií
 - baktericidní antibiotika
- Zileuton má:**
 - diuretické a kardiotonické účinky
 - parasympatolytické a betamimetické účinky
 - protizánětlivé a imunomodulační účinky
 - vazodilatační a antihypertenzní účinky
- K nejčastějším nežádoucím účinkům terapie hydroxychloroquinem patří:**
 - retinopatie
 - flu-like syndrom
 - zvracení
 - nefropatie
- Výsevy lokalizované formy granuloma anulare jsou nejčastěji přítomny na:**
 - hlavě
 - trupu
 - horních končetinách
 - dolních končetinách
- Generalizovaná forma granuloma anulare postihuje nejčastěji:**
 - děti do 10 let věku a ženy nad 40 let věku
 - děti do 10 let věku a muže nad 65 let věku
 - ženy nad 40 let věku a muže nad 55 let věku
 - ženy nad 65 let věku a muže pod 30 let věku

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikované v č. 5/2013:

Tomková H.: Závažné lékové exantémy

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8a, 9b, 10c.