

Kontrolní test

1. **Která diagnóza nepatří mezi chronické kopřivky?**
 - a) urticaria cholinergica
 - b) urticaria e frigore
 - c) urticaria solaris
 - d) urticaria pigmentosa
2. **Co hodnotíme při zjišťování UAS (Urticaria Activity Score)?**
 - a) pomfy a angioedém
 - b) pomfy a pruritus
 - c) pomfy a nutnost užívání antihistaminik
 - d) pruritus a angioedém
3. **Pacienti s akutní kopřivkou by měli:**
 - a) především 3–4 týdny držet dietu s omezením pseudoalergenů
 - b) užívat antibiotika k léčbě možných infekčních fokusů
 - c) podstoupit základní onkoscreening (RTG plic, PSA atd.)
 - d) být primárně léčeni nesedativními antihistaminiky, bez dalšího podrobnějšího vyšetřování
4. **Co nepatří do diferenciální diagnostiky u kopřivky?**
 - a) Schnitzlerův syndrom
 - b) urticaria vasculitis
 - c) ACE – inhibitory indukovaný angioedém
 - d) Gorlinův syndrom
5. **Co je standardní léčbou chronické kopřivky?**
 - a) sedativní antihistaminika podávaná na noc
 - b) bolus kortikosteroidů v první linii léčby
 - c) nesedativní antihistaminika druhé generace v první linii léčby
 - d) dieta s omezením pseudoalergenů
6. **Který preparát není podle nejnovějších doporučení vhodný k léčbě kopřivky?**
 - a) H1 – antihistaminika
 - b) kortikosteroidy
 - c) dapson
 - d) montelukast
7. **Která terapie je doporučována jako druhý krok u chronické kopřivky při selhání léčby první linie?**
 - a) výměna H1 – antihistaminika
 - b) přidání sedativního antihistaminika první generace na noc ke stávající terapii
 - c) přidání montelukastu ke stávající terapii
 - d) navýšení dávky H1 – antihistaminika druhé generace až na 4násobek základního dávkování
8. **Co nepatří do histologického obrazu kopřivky?**
 - a) edém kória
 - b) dilatace postkapilárních venul
 - c) parakeratóza
 - d) perivaskulární zánětlivý infiltrát
9. **Omalizumab je:**
 - a) anti TNF α protilátka
 - b) anti IgE protilátka
 - c) lék první volby u hereditárního angioedému
 - d) EGFR inhibitor
10. **Pro urticaria vasculitis platí, že:**
 - a) patří mezi fyzikální kopřivky
 - b) je vyvolána působením zvýšené teploty
 - c) mohou být postiženy vnitřní orgány
 - d) pomfy trvají 2–3 hodiny

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlejte na e-mailovou adresu redakce: kozni@lfl.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 1/2014:

Bienová, M.: Dermatoskopická diagnostika alopecí

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4d, 5a, 6d, 7b, 8c, 9b, 10c.