

TEST

TEST Z EPIDEMIOLOGIE

1. Pasivní imunita vzniká

- a) po očkování živou nebo inaktivovanou vakcínou
- b) podáním hotových protilátek ve formě hyperimunních zvířecích sér nebo lidského imunoglobulinu
- c) po prožitém onemocnění
- d) transplacentárním přestupem mateřských protilátek na novorozence

2. K přímému přenosu infekce dochází při

- a) poškrábání či pokousání zvířetem
- b) kontaktu s kontaminovanými předměty
- c) poranění injekčními stříkačkami a jehlami
- d) doteku, sexuálním styku, kontaktem s výměty infikované osoby nebo zvířete

3. Ochrana proti virové hepatitidě A po očkování vzniká

- a) ihned po očkování první dávkou vakcíny
- b) do 7 dnů po naočkování první dávkou vakcíny

- c) za 14–30 dnů po naočkování první dávkou vakcíny
- d) za 14–30 dnů po naočkování druhou dávkou vakcíny

4. Nejčastějším původcem průjmových onemocnění u cestovatelů do zahraničí jsou

- a) *Salmonely*
- b) *E. coli*
- c) *Rotaviry*
- d) *Lambliia intestinalis*

5. Mezi transmisivní nákazy patří

- a) malárie
- b) nákazy vyvolané Echoviry
- c) horečka dengue
- d) echinokokóza

Správné odpovědi:
1. b, d; 2. a, d; 3. c, 4. b, 5. a, c.