

# Cushingův syndrom a kardiovaskulární riziko

M. Kršek

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

## Souhrn

Cushingův syndrom je vzácné onemocnění charakterizované autonomní nadprodukcí kortizolu a jeho zvýšenými účinky na prakticky všechny tkáně lidského těla. Jeho klinický obraz je proto velmi komplexní. Jednou z hlavních charakteristik Cushingova syndromu je významné zvýšení morbidit a mortality především v důsledku kardiovaskulárního postižení. Tento článek shrnuje základní poznatky o Cushingově syndromu, patogenezi klinických příznaků, zejména těch, které mají vztah ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku, a základy diagnostiky a léčby Cushingova syndromu.

## Klíčová slova

Cushingův syndrom – hypertenze – metabolický syndrom – kardiovaskulární riziko

## Cushing's syndrome and cardiovascular risk

### Abstract

Cushing's syndrome is a rare disorder characterised by increased autonomous production of cortisol and its exaggerated effects on virtually all tissues in the human body. Therefore its clinical presentation is very complex. One of its main features is significantly increased morbidity and mortality mainly due to cardiovascular disorders. This article reviews basic knowledge about Cushing's syndrome, pathogenesis of clinical signs, mainly those related to increased cardiovascular risk and basics of diagnosis and treatment of Cushing's syndrome.

### Keywords

Cushing's syndrome – hypertension – metabolic syndrome – cardiovascular risk

## Úvod

Cushingův syndrom (CS) vzniká v důsledku autonomní nadprodukce kortizolu a jeho působením na buňky a tkáně organismu [1]. Jedná se o vzácné onemocnění s odhadovanou incidencí 1–3 nové případy/1 000 000 obyvatel/1 rok. Svě nositele postihuje komplexně na mnoha úrovních a aktivní CS je charakterizován významně zvýšenou morbiditou a mortalitou především v důsledku kardiovaskulárního postižení. Zvýšené kardiovaskulární riziko u pacientů s Cushingovým syndromem má komplexní patogenezi, která bude rozebrána níže. Vzhledem k závažnosti onemocnění je nutné včasné stanovení jeho přesné etiologické diagnózy a včasná a správná léčba.

## Etiologie a patogenese Cushingova syndromu

Endogenní CS je onemocnění s vícečetnou etiologií. Základní rozdělení podle nadprodukce adrenokortikotropního hormonu (ACTH) je na ACTH-dependentní CS, který představuje přibližně 75 % případů endogenního CS, a ACTH-in-

dependentní CS představující přibližně 25 % případů endogenního CS. ACTH-dependentní CS způsobený primárně nadprodukcí ACTH dále dělíme na převažující centrální CS či Cushingovu chorobu, za kterou je zodpovědný ACTH produkující adenom hypofýzy, a tzv. paraneoplastický CS či ektopický ACTH syndrom vznikající v důsledku ektopické nadprodukce ACTH jinými tumory v těle. ACTH-independentní CS je v 98–99 % způsoben kortizol produkujícím tumorem nadledvin, adenomem či karcinomem, za 1–2 % je zodpovědná bilaterální hyperplazie nadledvin buď ACTH-independentní makronodulární adrenální hyperplazie (AIMAH), nebo primární pigmentovaná nodulární adrenální nemoc (PPNAD) dříve nazývaná též mikronodulární adrenální hyperplazii. Stručně shrnutí etiologie CS je uvedeno v tab. 1 [2].

## Klinický obraz Cushingova syndromu

Klinický obraz CS je velmi pestrý a variabilní a souhrn příznaků vede obvykle k závažnému

postižení svého nositele [3]. Mezi základní klinické příznaky patří centrální (trunkální) obezita kontrastující s tenkými končetinami. Tuk se deponuje zejména ve viscerální oblasti, dále v oblasti obličeje (měsícovitý obličej – moon face), v oblasti šíje (býčí šíje – buffalo hump), v supraklavikulárních prostorách, ale i v mediastinu, v oblasti páteře. Kůže a podkoží jsou tenké, snadno zranitelné, rány se obtížně hojí, časté jsou kožní infekce, zejména bakteriální. Typickým, nikoli však konstantním příznakem jsou lividní strie typicky široké až cca 1 cm vyskytující se na bříše, ale i v méně typických lokalizacích, jako jsou stehna, hýždě, prsa, axilly. U žen se vlivem androgenů na kůži vyskytuje často akné, hirsutismus nebo alopecie. Svaly jsou postižené tzv. steroidní myopatií, dochází k jejich atrofizaci, která se podílí na vzhledu tenkých končetin kontrastujících s trunkální obezitou a která postihuje více pleťencové svalstvo. Pacienti proto špatně vstávají ze dřepu, chodí do schodů, obtíže jim dělá práce pažemi zejména nad horizontálou.

Tab. 1. Etiologie endogenního Cushingova syndromu. Upraveno dle [2].

V prvním sloupci je uvedeno přibližné zastoupení ACTH-dependentních a ACTH-independentních forem v rámci endogenního Cushingova syndromu. Ve druhém sloupci pak zastoupení jednotlivých forem v rámci těchto podskupin.

<b>ACTH-dependentní Cushingův syndrom</b> (75–80 %)	ACTH produkující adenom hypofýzy (80 %) ektopická nadprodukce ACTH jiným tumorem (20 %) ektopická nadprodukce CRH (vzácná)
<b>ACTH-independentní Cushingův syndrom</b> (20–25 %)	adenom kůry nadledvin unilaterální (60–70 %) karcinom kůry nadledvin (30–40 %) adenomy kůry nadledvin bilaterální (vzácné) primární pigmentovaná adrenální nodulární nemoc (PPNAD) (vzácná) ACTH independentní makronodulární adrenální hyperplazie (AIMAH) (vzácná) Mc Cuneův-Albrightův syndrom (vzácný)

ACTH – adrenokortikotropní hormon, AIMAH – ACTH-independentní makronodulární adrenální hyperplazie (ACTH independent macronodular adrenal hyperplasia), CRH – kortikoliberin (corticotropin releasing hormone), PPNAD – primární pigmentovaná adrenální nodulární nemoc (primary pigmented nodular adrenal disease)

Tab. 2. Klinické příznaky Cushingova syndromu. Upraveno dle [4].

Příznak/frekvence (%)	Ross a Linch (n = 70) [3]	UrbanicaGeorge (n = 31) [5]	Soffer et al (n = 50) [6]
obezita o přírůstek hmotnosti	97	79	86
arteriální hypertenze	74	77	88
pletora	94	–	78
měsícovitý obličej	88	–	92
hirzutismus	81	64	84
ztenčení kůže	–	84	–
porucha glukózové tolerance	50	39	84
hematomy, ekchymózy	62	77	88
slabost	56	90	58
osteopenie, fraktury	50	48	56
EKG abnormality/ateroskleróza	55	–	34
poruchy menstruace	84	69	72
pokles libida (muži/ženy)	100	55	100/33
letargie, deprese	62	48	40
bolesti hlavy	47	–	–
bolesti zad	43	39	–
strie	56	51	50
otoky	50	48	66
akne	21	35	–
býčí šije	54	–	34
vypadávání vlasů (u žen)	13	–	51
recidivující infekce	25	–	14
bolesti břicha	21	–	–

Komplexní jsou příznaky způsobené metabolickými účinky glukokortikoidů, kromě redistribuce tuku dochází k proteokatabolismu a poruše glukózové tolerance. Tyto příznaky spolu se změnami spektra lipoproteinů, poruchou glukózové tolerance, arteriální hypertenzí, retencí sodíku a tekutin a hyperkoagulačním stavem vedou ke zvýšení kardiovaskulárního rizika a budou rozebrány níže. Dalším metabolickým příznakem je negativní kalciová bilance a úbytek kostní hmoty se vznikem osteopenie a osteoporózy.

Základní klinické příznaky jsou uvedeny v tab. 2 [3–6]. Typický vzhled pacientky s Cushingovým syndromem je uveden na obr. 1.

### Kardiovaskulární riziko u Cushingova syndromu

CS je onemocnění závažné, provázené významně zvýšenou celkovou morbiditou a mortalitou, v případě aktivního onemocnění až 4x vyšší v porovnání s běžnou populací. Na zvýšené celkové morbiditě a mortalitě se nejvyšší měrou podílí právě postižení kardiovaskulární. Zvýšené kardiovaskulární riziko je dáno především komplexním postižením metabolickým (viscerální obezita, porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus, porucha metabolismu lipidů a lipoproteinů, retence sodíku a vody), k nim dále přistupuje arteriální hypertenze a hyperkoagulační stav.

### Metabolický syndrom a obezita

Jak vyplývá z výše uvedeného souhrnu metabolických příznaků CS, splňuje velké množství pacientů diagnostická kritéria metabolického syndromu. V literatuře se uvádí, že je to nejméně u 30 % pacientů a rovněž u více než 30 % pacientů s CS je při vyšetření diagnostikovatelná přítomnost aterosklerotických plátů. Za hlavní patogenetický faktor vzniku metabolického syndromu je pokládána viscerální obezita, jejíž patogenese je komplexní, ale podstatnou úlohu v jejím vzniku hrají účinky kortizolu [7]. Kortizol zvyšuje chuť k jídlu, stimuluje diferenciaci adipocytů, stimuluje aktivitu lipoproteinové lipázy a aktivitu syntázy mastných kyselin.

### Porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus

Patří k základním klinickým znakům CS a jsou dalším zásadním faktorem vedoucím k rozvoji

metabolického syndromu. U více než 50 % pacientů se setkáváme s některou z poruch glukózového metabolismu, zvýšenou glykemií na lačno, porušenou glukózovou tolerancí, nebo manifestním diabetes mellitus. Je ale pravděpodobné, že výskyt těchto poruch bude ještě vyšší, protože ne u všech pacientů s CS se rutinně provádí orální glukózový toleranční test. Hlavním patogenetickým momentem poruchy glukózového metabolismu jsou přímo účinky kortizolu, jehož zvýšené koncentrace vedou k inzulinové rezistenci periferních tkání (především v jaterní, příčně pruhovaném svalstvu a tukové tkáni), dále pak k dysfunkci betabuněk pankreatu a ke snížení inzulinotropního účinku GLP-1 (glucagon-like peptid-1) [9–11].

### Dyslipidemie

Dyslipidemie je považována za další významný kardiovaskulární faktor u CS. Údaje o změnách koncentrací lipoproteinů u CS jsou však nejednotné. Nejčastěji je popisováno zvýšení koncentrací celkového cholesterolu, zvýšení koncentrací triacylglycerolů a zvýšený poměr LDL cholesterol : HDL cholesterol. I přesto, že tyto údaje nejsou konsenzuální, zdá se být zřejmé, že u CS existuje řada změn metabolismu lipoproteinů, které ke zvýšení kardiovaskulárního rizika vedou a které jsou důsledkem přímých nebo nepřímých účinků kortizolu. Nadbytek glukokortikoidů vede v tukové tkáni ke stimulaci aktivity lipoproteinových lipáz (hormon-senzitivní lipázy a lipázy triacylglycerolů tukové tkáně), permisivnímu vlivu na lipomobilizační účinek katecholaminů v tukové tkáni, stimulaci lipolýzy, stimulaci adipogenezy ve viscerální tukové tkáni a inhibici aktivity AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK) ve viscerální tukové tkáni. Na jaterní úrovni vedou glukokortikoidy k inzulinové rezistenci, zvýšení glukoneogeneze, hromadění triacylglycerolů, zvýšení syntézy VLDL částic, zvýšení lipogeneze, inhibici betaoxidace volných mastných kyselin, zvýšení aktivity AMPK, vzniku jaterní steatózy [15].

### Arteriální hypertenze

Vyskytuje se až u 75 % pacientů s CS a CS patří mezi základní typy sekundární hypertenze s často typickými znaky, jako je rychlý rozvoj, tíže hypertenze, rezistence na léčbu, vymizení cirkadiálního rytmu TK, u vysoce aktivních případů rovněž hypokalemie. Patogeneticky se na rozvoji arteriální hypertenze u CS podílí řada faktorů [13]. Nadbytek volného kortizolu




Obr. 1. Vzhled pacientky s Cushingovým syndromem (archiv autora).

v renálních tubulech stimuluje mineralokortikoidní receptory, které jsou stimulovány též intermediárními steroidními metabolity s mineralokortikoidní aktivitou. U CS je popisována aktivace systému renin-angiotenzin. Kortizol potence inotropní a presorické účinky vazodilatačních látek (katecholaminů, angiotenzinu II, vazopresinu) a naopak snižuje aktivitu vazodilatačních mechanismů (snižuje aktivitu NO syntézy, oslabuje vazodilatační aktivitu prostacyklinu a systému kinin-kalikrein) [14]. Důležitou úlohu pravděpodobně hraje i aktivace glukokortikoidních a mineralokortikoidních receptorů v centrálním nervovém systému.

### Srdce u Cushingova syndromu

O funkci a morfologii srdce u CS neexistuje mnoho prací. U aktivního CS je popisována porucha geometrie levé komory srdeční s hypertrofií svaloviny a s diastolickou dysfunkcí, zejména poruchou relaxace a plnění komory. Systolická funkce bývá zachována. Popisované změny jsou většinou reverzibilní po úspěšné léčbě CS. U CS je popisována i dysbalance mezi sympatikem a parasympatikem a alterovaná variabilita srdeční frekvence, které rovněž mohou přispívat ke zvýšené kardiovaskulární morbiditě a mortalitě. U pacientů s CS je proto doporučováno provádět holterovské monitorování



Obr. 2. Algoritmus diagnostiky Cushingova syndromu Upraveno dle [19].

CS – Cushingův syndrom; DST – dexametazonový supresní test

EKG k průkazu němých arytmií a/nebo ischemií [15].

### Cévy u Cushingova syndromu

Hlavní cévní změnou prokazovanou u CS je ateroskleróza. V řadě studií byla prokázána zvýšená intimomediální tloušťka karotid (IMT) u pacientů s aktivním CS ve srovnání se zdravými kontrolami přetrvávající řadu let po úspěšné léčbě a svědčící pro pravděpodobné přetrvávající kardiovaskulární riziko. Některé studie zaznamenaly i alteraci parametrů endoteliální funkce, zvýšení koncentrací endotelinu, vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, adhezivních cévních molekul a některých dalších cytokinů asociovaných se zvýšením kardiovaskulárního rizika [16].

### Diagnostika a léčba Cushingova syndromu

Vzhledem k závažnosti CS je nutná včasná a přesná etiologická diagnostika, která umožní časnou a etiologicky správnou léčbu. Na tomto místě budou uvedeny jen jejich základní principy.

### Diagnostika Cushingova syndromu

Základním momentem je průkaz autonomní nadprodukce kortizolu. Za test první volby při podezření na CS je považován **dexametazonový supresní test s nízkou dávkou dexametazonu (LDDST)**. LDDST testuje funkci zpětnovazební kontroly sekrece kortizolu, resp. autonomii jeho nadprodukce. V nejjednodušší, tzv. zkrácené („overnight“) variantě, pacientům podáváme ve 23:00 hod perorálně 1 mg dexametazonu a druhý den ráno v 8:00 hod odebíráme krev na stanovení koncentrace kortizolu. Hodnoty kortizolu po dexametazonu pod 50 nmol/l s 99% spolehlivostí CS vylučují, hodnoty nad 148 nmol/l jsou suspektní s přítomností CS, hodnoty 50–148 nmol/l představují tzv. šedou zónu, kdy vyšetření opakujeme a doplňujeme další testy. **Vylučování volného močového kortizolu za 24 hod** je vyšetření, které používáme pro kvantifikaci nadprodukce kortizolu. Vzhledem k variabilitě vylučování kortizolu je doporučováno vycházet z nejméně tří stanovení. **Vyšetření nočního kortizolu (24.00)**

**v séru (plazmě).** U pacientů s CS dochází k oploštění cirkadiálního rytmu sekrece kortizolu a k vymizení fyziologického nočního poklesu. K nadiru sekrece kortizolu dochází fyziologicky v noci po usnutí. Technicky správně má být proto odběr proveden u spícího pacienta z předem zavedené nitrožilní kanyly. Fyziologicky dochází v noci k poklesu kortizolemie pod 148 nmol/l, hodnoty vyšší jsou suspektní z přítomnosti CS. **Vyšetření nočního kortizolu ve slinách** je metodou v současnosti zaváděnou na řadě pracovišť specializovaných na diagnostiku CS. Odběr slin je prováděn do speciálních zkumavek zpravidla ve 23.00 hod. Výhodou je, že koncentrace ve slinách reflektují koncentrace volného kortizolu a že slinné koncentrace jsou méně a pomaleji ovlivnitelné stresem. Metoda je však náročná technicky především na odběr a zpracování slin a standardizaci měření se stanovením vlastních diskriminačních hodnot.

Základní algoritmus diagnostiky CS je uveden na obr. 2 [17,18].

### Diferenciální diagnostika Cushingova syndromu

Diferenciální diagnostika CS syndromu patří mezi nejobtížnější v klinické endokrinologii, a její podrobný popis přesahuje rámec této publikace [17,18].

Základní rozlišení mezi základními formami podle sekrece ACTH provádíme po dvou nezávislých ranních měřeních jeho plazmatických koncentrací.


Normální nebo zvýšené koncentrace ACTH (nad 10 pg/ml) svědčí pro ACTH-dependentní CS. V tomto případě pokračujeme diferenciální diagnostikou mezi hypofyzární a ektopickou sekrecí ACTH. Suprimované koncentrace ACTH (pod 5 pg/ml) svědčí pro primární (nadledvinovou) etiologii. V tomto případě následuje zobrazení nadledvin pomocí výpočetní tomografie nebo magnetické rezonance.

Základní algoritmus diferenciální diagnostiky a jejích výstupů pro léčbu je uveden na obr. 3 [19].

### Léčba Cushingova syndromu

Léčba CS je specifická pro každou jeho etiologickou formu. Podrobný popis opět překračuje rámec této publikace.

**Cushingovu nemoc**, tedy ACTH produkující adenom hypofýzy, léčíme primárně neurochirurgicky. Při neúspěchu neurochirurgické



Obr. 3. Schéma diferenciální diagnostiky a terapeutických výstupů u Cushingova syndromu.

ACTH – adrenokortikotropní hormon, AIMAH – ACTH independentní makronodulární adrenální hyperplazie (ACTH independent macronodular adrenal hyperplasia), BIPSS – bilaterální katetrizace sinus petrosi inferiores s odběry (bilateral inferior petrosal sinuses sampling), CRH – kortikoliberin (corticotropin releasing hormone), CT – výpočetní tomografie (computer tomography), HDDST – dexametazonový supresní test s vysokou dávkou dexametazonu (high dose dexamethasone suppression test), MR – magnetická rezonance, PPNAD – primární pigmentovaná adrenální nodulární nemoc (primary pigmented nodular adrenal disease)

léčby je indikována reoperace nebo stereotaktická radiační léčba. Při trvající hormonální aktivitě musíme léčit medikamentózně, často kombinací různých léků.

**Paraneoplastický Cushingův syndrom** řešíme individuálně podle toho, jaký tumor produkuje ACTH. Ve většině případů je metodou první volby léčba chirurgická.

**Periferní Cushingův syndrom.** Jeho příčinou je v 98–99 % tumor jedné nadledviny a metodou volby je provedení adrenalectomie, v dnešní době většinou laparoskopické. U adenomu nadledviny jde o výkon kurativní, v případě karcinomu záleží na stadiu onemocnění a kompletnosti výkonu. U vzácné AIMAH můžeme zkusit specifickou léčbu medikamentózní, ale u většiny případů je nakonec indikována bilaterální adrenalectomie. U PPNAD je metodou volby bilaterální adrenalectomie. Po bilaterální adrenalectomii následuje doživotní léčba hypokortikalizmu.

Podrobný popis léčby Cushingova syndromu v ČR je shrnut v doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu CS v dospělosti [20].

### Léčba přidružených poruch

Ke správné léčbě CS a zlepšení jejich prognózy však nepatří pouze specifická endokrinologická léčba, ale je nutné ovlivňování všech přidružených poruch a rizik, a to nejen v době aktivního CS, ale i po jeho úspěšné léčbě, neboť existují doklady pro přetrvávající riziko, zejména kardiovaskulární, i mnoho let po úspěšném vyléčení CS. K léčbě CS tedy nedílně patří dietní a režimová opatření, aerobní trénink, redukce hmotnosti, léčba poruchy glukózové tolerance či diabetes mellitus, důsledná léčba arteriální hypertenze a léčba dyslipidemie. Dlouhodobě léčíme i další přidružené choroby, např. osteoporózu [20].

### Literatura

1. Cushing HW. The basophil adenomas of the pituitary body and their clinical manifestations (pituitary basophilism). Bull Johns Hopkins Hosp 1932; 50: 137–195.
2. Kršek M, Hána V, Vymazal J et al. Cushingův syndrom. Praha: Galén 2006.
3. Ross EJ, Linch DC. Cushing's syndrome-killing disease: discriminatory value of signs and symptoms aiding early diagnosis. Lancet 1982; 2: 646–649.
4. Nieman LK. Cushing's syndrome. In: De Groot LJ, Jameson JL. (Eds), Endocrinology. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders 2001.
5. Urbanic RC, George JM. Cushing's disease – 18 years' experience. Medicine (Baltimore) 1981; 60: 14–24.
6. Soffer LJ, Iannaccone A, Gabrilove JL. Cushing's syndrome: A study of fifty patients. Am J Med 1961; 300: 129–135.
7. Pivonello R, Faggiano A, Lombardi G et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk in Cushing's syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am 2005; 34: 327–339.
8. Tataranni PA, Larson DE, Snitker S et al. Effects of glucocorticoids on energy metabolism and

food intake in humans. *Am J Physiol* 1996; 271: E317–E325.

9. Qi D, Rodrigues B. Glucocorticoids produce whole body insulin resistance with changes in cardiac metabolism. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2007; 292: E654–E667.

10. Hansen KB, Vilsbøll T, Bagger JI et al. Reduced glucose tolerance and insulin resistance induced by steroid treatment, relative physical inactivity and high-calorie diet impairs the incretin effect in healthy subjects. *J Clin Endocrinol Metab* 2010; 95: 3309–3317. doi: 10.1210/jc.2010-0119.

11. Pivonello R, De Leo M, Vitale P et al. Pathophysiology of diabetes mellitus in Cushing's syndrome. *Neuroendocrinology* 2010; 92 (Suppl 1): 77–81. doi: 10.1159/000314319.

12. Greenman Y. Management of dyslipidemia in Cushing's syndrome. *Neuroendocrinology* 2010; 92 (Suppl 1): 91–95. doi: 10.1159/000314294.

13. Saruta T, Suzuki H, Handa M et al. Multiple factors contribute to the pathogenesis of hyperten-

sion in Cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 1986; 62: 275–279.

14. Mitchell BM, Webb RC. Impaired vasodilatation and nitric oxid synthase activity in glucocorticoid-induced hypertension. *Biol Res Nurs* 2002; 4: 16–21.

15. Arnaldi G, Scandali VM, Trementino L et al. Pathophysiology of dyslipidemia in Cushing's syndrome. *Neuroendocrinology* 2010; 92 (Suppl 1): 86–90.

16. Pereira AM, Delgado V, Romijn JA et al. Cardiac dysfunction is reversed upon successful treatment of Cushing's syndrome. *Eur J Endocrinol* 2010; 162: 331–340. doi: 10.1530/EJE-09-0621.

17. Faggiano A, Pivonello R, Spiezia S et al. Cardiovascular risk factors and common carotid artery calibre and stiffness in patients with Cushing's disease during active disease and 1 year after disease remission. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 88: 2527–2533.

18. Newell-Price J. Diagnosis/differential diagnosis of Cushing's syndrome: a review of best practice. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2009;

23 (Suppl 1): S5–S14. doi: 10.1016/S1521-690X(09)70003-X.

19. Nieman LK, Biller BM, Findling JW et al. The Diagnosis of Cushing's Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2008; 93: 1526–1540. doi: 10.1210/jc.2008-0125.

20. Kršek M, Čáp J, Hána V et al. Doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu v dospělosti. *Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa* 2013; 16: 63–71.

*Doručeno do redakce: 11. 3. 2015*

*Přijato po recenzi: 25. 3. 2015*

**prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.**

[www.vfn.cz](http://www.vfn.cz)

[michal.krsek@lf1.cuni.cz](mailto:michal.krsek@lf1.cuni.cz)

**INTRANET | DIA**

[www.cis-intranet.cz/diaintranet](http://www.cis-intranet.cz/diaintranet)