

# Prevenca sekundárnych fraktúr: multiodborové konsenzuálne stanovisko ku klinickým odporúčaním – komentár k prelači

## Secondary fracture prevention: consensus clinical recommendations from a multistakeholder coalition – comment to reprint

Martin Kužma, Juraj Payer

V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava  
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS

✉ **doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.** | martin.kuzma@fmed.uniba.sk | www.fmed.uniba.sk

Received | Doručeno do redakce | Doručené do redakcie 1. 6. 2020

### Komentár

Napriek tomu že vo svete, ako aj v našom stredoeurópskom priestore, máme dostatok možností na diagnostiku, liečbu a ďalší manažment osteoporózy a prevencie fraktúr, množstvo pacientov, ktorí by túto komplexnú starostlivosť potrebovali, sa k uvedenej liečbe nedostane. Preto, Americká spoločnosť pre výskum kosti (ASBMR- American Society for Bone and Mineral Research) podnietila vznik tzv. koalície spoločností/expertov za účelom vytvorenia klinických odporúčaní pre sekundárnu prevenciu fraktúr. Skupina ľudí, ktorí utrpia fraktúru krčka stehrovej kosti alebo stavca, bez pochyb najviac profituje zo špecifickej liečby. **Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK)** Slovenskej lekárskej spoločnosti sa tiež podieľala na vytvorení predložených odporúčaní. Odporúčania sú zhrnuté do 7 základných a 6 doplňujúcich bodov. Autorským kolektívom ako aj autoritami ASBMR bolo doporučené publikovať „reprint“ originálneho článku v referenčných časopisoch jednotlivých participujúcich spoločností.