

## Komplexy kovov v medicíne a farmácii – minulosť a súčasnosť III

### Metal complexes in medicine and pharmacy – the past and the present III

Ladislav Habala • Jindra Valentová

Došlo 6. decembra 2019 / Prijaté 16. januara 2020

#### Súhrn

Komplexy kovov s biologickou aktivitou predstavujú perspektívnu a rýchle sa rozvíjajúcu oblasť farmakoterapie. Po prvej časti prehľadu o metalofarmakách venovanej antimikróbny účinkom komplexov kovov a ich využitiu v diagnostike ochorení a druhej časti zaoberajúcej sa úlohou týchto zlúčenín v liečbe rakoviny sa táto tretia a záverečná časť prehľadu zameriava na vybrané ďalšie aplikácie kovov v terapii (predovšetkým na terapiu reumatoidnej artritídy, niektorých psychických ochorení, diabetu, ako aj na chelatačnú terapiu). Popri stručnom náčrte historického vývoja klinického využitia danej kategórie liečiv sú diskutované tiež ich chemické vlastnosti, toxicita, klinické aplikácie a mechanizmus účinku. Tento stručný prehľad má za cieľ poskytnúť základnú orientáciu v tejto problematike pre farmaceutov, chemikov a ostatných záujemcov o danú oblasť z radov odbornej verejnosti, ako aj motivovať k ďalšiemu štúdiu tejto atraktívnej oblasti farmaceutického výskumu.

**Kľúčové slová:** bioanorganická chémia • metalofarmaká • komplexy kovov • zlato • vanád • lítium • chelatačná terapia

#### Summary

Bioactive metal complexes represent a promising and rapidly evolving area of pharmacotherapy. After the first part of our survey on metallopharmaceuticals dealing with antimicrobial activity of metal complexes and their application in diagnostics and the second part dedicated to anticancer properties of these compounds, this third and last part of the review focuses on several other applications of metals in therapy (mainly on the therapy of rheumatoid arthritis, some mental diseases, diabetes, as well as on chelation therapy). Following

a brief account of the historical development of clinical use of the respective category of drugs, their chemical properties, toxicity, clinical applications and mechanism of action are discussed. The aim of this brief survey is to provide basic outline of the area of metallopharmacy, aimed at specialists in pharmacy and chemistry as well as at the general educated public.

**Key words:** bioinorganic chemistry • metallopharmaceuticals • metal complexes • gold • vanadium • lithium • chelation therapy

#### Zlato v liečbe reumatických ochorení

Zlato je ušľachtilý kov, známy už najstarším civilizáciami. Vzhľadom k tomu, že sa v prírode vyskytuje prakticky len vo svojej najstabilnejšej, teda elementárnej forme, bolo zrejme prvým používaným kovom. Napriek svojej chemickej inertnosti vytvára veľký počet komplexných zlúčenín, predovšetkým v jeho najstabilnejších oxidačných stupňoch I a III. Na rozdiel od iných prechodných kovov sú „voľné“ ióny  $Au^+$  a  $Au^{3+}$  (t. j. akvakomplexy zlata) vo vodnom roztoku nestabilné a majú tendenciu podliehať redukcii až na elementárne zlato, je však možné tieto oxidačné čísla stabilizovať komplexáciou vhodnými ligandmi<sup>1)</sup>. Zlato ako mäkký akceptor podľa teórie HSAB prednostne koordinuje s mäkkými donorovými atómami, najmä so sírou. Kým centrálné atómy zlata v oxidačnom stupni I majú najčastejšie koordinačné číslo 2 s lineárnou koordinačnou geometriou, zlatité komplexy sú prevažne tetrakoordinované v štvorcovo-planárnej geometrii.

Moderné využitie zlata v terapii vychádza z objavu *in vitro* antimikróbnej účinnosti zlatitých kyanidokomplexov koncom 19. storočia. Napriek tomu, že sa táto aktivita nepotvrdila *in vivo*, sa zlúčeniny zlata používali v terapii tuberkulózy ešte v 20. a 30. rokoch 20. storočia<sup>2)</sup>. Jednalo sa najmä o komplexy s tiolátovými ligandmi, so zlatom v oxidačnom stupni III. V tomto období tiež dochádza k objavu protizápalových účinkov týchto zlúčenín. Francúzsky lekár Jacques Forestier skúmal účinnosť komplexných zlúčenín zlata v reumatoidnej artritíde, pôvodne využívaných v terapii tuberkulózy, považujúc tieto dve ochorenia za príbuzné<sup>3,4)</sup>.

Ing. Ladislav Habala, PhD. (✉) • J. Valentová  
Katedra chemickej teórie liečiv  
Farmaceutická fakulta UK  
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovak Republic  
e-mail: habala@fpharm.uniba.sk

Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie, ktoré postihuje značnú časť populácie<sup>5)</sup>. Jedná sa o autoimunitné ochorenie. Postihuje najprv kĺby, neskôr aj iné orgány a v súčasnosti má negatívnu dlhodobú prognózu. Jej prvotná príčina nie je jednoznačne známa. Mechanizmus ochorenia je komplexný a zahrňuje aktiváciu makrofágov, T- a B-lymfocytov, ktoré produkujú cytokíny a protilátky proti vlastným tkanivám. Najprv je poškodená synoviálna membrána, neskôr nastáva deštrukcia chrupavky a kosti v kĺbe. To vedie k úbytku kostnej hmoty, protiľahlé kĺby sa spoja a kĺb sa stáva nepohyblivým.

V liečbe reumatoidnej artritídy zlúčeninami zlata (tiež **chryzoterapii**) sa uplatnili komplexné zlúčeniny zlata v koordinačnom stupni I a s ligandmi typu tiolov, napr. tiosíran (aurotiosulfát) a tiojablčnan (aurotiomalát)<sup>6)</sup>. Tento typ zlatých komplexov dominoval v terapii artritídy od jej počiatkov až do začiatku 90. rokov, kedy dochádza k postupnému nástupu nových antireumatík. Až koncom 70. rokov 20. storočia sa presadil zlatý komplex iného typu – auranofin, umožňujúci perorálnu administráciu liečiva<sup>7)</sup>. Pri tiolátokomplexoch zlata sa napriek zdanlivo jednoduchému zloženiu nejedná o nízkomolekulové monoméne komplexy s jedným centrálnym atómom zlata, ale o oligoméne až polymérne štruktúry s lineárnym reťazcom, tvoreným atómami zlata premostenými atómami síry. **Auranofin** (2,3,4,6-tetra-*O*-acetyl-1-tio- $\beta$ -D-glukopyranozáto)(trietylfosfán) zlatý komplex (obr. 1) je jednojadrový komplex s vlastnosťami odlišnými od komplexov tiolátového typu.

Mechanizmus aktivity zlata v terapii reumatoidnej artritídy nie je doposiaľ uspokojivo preskúmaný. K celkovému imunosupresívne účinku zrejme prispieva viacero molekulárnych mechanizmov. Patria k nim modifikácia biosyntézy prostaglandínov a homeostázy medi v organizme, inhibícia lyzozomálnych enzýmov, ovplyvnenie homeostázy reaktívnych foriem kyslíka (ROS), imunomodulačná aktivita – inhibícia fagocytózy, exkrécie histamínu, zníženie hladiny imunoglobulínov a viaceré ďalšie.

Liečivá na báze komplexov zlata prejavujú pomerne vysokú reaktivitu v reakciách zámene ligandov, predovšetkým voči ligandom obsahujúcim síru a tiež voči redukcii/oxidácii. V priebehu farmakologických experimentov sa ukázalo, že tieto komplexy podliehajú rýchlej metabolizácii *in vivo*, a fungujú teda ako prekurzory aktívnej formy liečiva<sup>8)</sup>. Už v priebehu krátkej doby po administrácii sa značná časť viaže na zložky krvi, pre-


dovšetkým na albumín (cysteínové zvyšky). Zostávajúca časť nepozmenených molekúl liečiva len ťažko preniká do bunky, avšak môže sa viazať na povrchové štruktúry bunky obsahujúce sulfhydrylové skupiny. Výnimku predstavuje auranofin, ktorý na rozdiel od polymérnych tiolátokomplexov vykazuje výraznú a rýchlu resorpciu cez cytoplazmatickú membránu. Na druhej strane, tieto komplexy reagujú s kyanidovými aniónmi prítomnými v organizme za vzniku spoločného metabolitu,  $\text{Au}(\text{CN})_2^-$ , u ktorého bol pozorovaný podstatne ľahší prechod do bunky.

Zlúčeniny zlata v oxidačnom stupni I aj III majú výraznú tendenciu podliehať v prítomnosti vhodných redukčných činidiel redukcii až na elementárne zlato. Bolo experimentálne potvrdené, že za vhodných podmienok môže k takejto redukcii dochádzať aj *in vivo*. Zaujímavým zistením bolo, že vznikajúce čiastočky zlata (nanočastice) samy o sebe vykazujú značnú protizápalovú aktivitu<sup>9)</sup>.

Chryzoterapia je charakteristická individuálnou odozvou pacientov na liečbu. Údaje o klinickej účinnosti sa značne líšia, pričom maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 70 %. V priebehu terapie sa môžu vyskytnúť rôzne nežiaduce účinky, vyžadujúce si predčasné ukončenie liečby, avšak tieto majú len v zriedkavých prípadoch závažnejší charakter. Jedná sa napr. o kožné prejavy ako vyrážky (exantém), zhoršenie krvného obrazu, zápaly gastrointestinálneho traktu (enterokolitída), pľúcna fibróza, renálne a neurologické komplikácie, u perorálne aplikovaného auranofinu tiež diareá a iné<sup>10)</sup>. Taktiež môže dochádzať k akumulácii zlata v pokožke a niektorých orgánoch, čo vedie k zmenám farby pokožky na sivú až fialovú (chryziáza), podobne ako v prípade striebra (argýria). Polymérne komplexy zlata (ako aurotiomalát) sa spravidla aplikujú intramuskulárne v týždňových intervaloch, pričom typická dávka je do 50 mg/týždeň. Auranofin môže byť kvôli svojej vyššej biodostupnosti (20–30 %) podávaný perorálne, s dennou dávkou 6–9 mg. Vzhľadom k svojmu špecifickému mechanizmu účinku si tieto liečivá uchovávajú určitý význam v terapii reumatoidnej artritídy i dnes, napriek postupnému ústupu od 90. rokov 20. storočia v súvislosti so zavedením nových metód liečby – nesteroidových antiflogistík, glukokortikoidov a najmä tzv. liečiv modifikujúcich ochorenie (DMARDs – disease modifying antirheumatic drugs). Ich prednosťou je i relatívna cenová výhodnosť v porovnaní s najnovšími DMARDs. V poslednej dobe je badateľná obnova záujmu o tieto liečivá, často v rámci novokoncepovaných kombinačných terapií. Predmetom výskumu je tiež využitie komplexov zlata pôvodne určených pre liečbu reumatoidnej artritídy v iných oblastiach terapie<sup>11)</sup>.

### Komplexy vanádu ako antidiabetiká

Vanád, napriek svojej značnej rozšírenosti v prírode, patrí k menej preskúmaným prechodným prvkom. Jedná sa o redoxne aktívny prvok vyskytujúci sa vo viacerých oxidačných stupňoch (II, III, IV, V), pričom najstabilnejšími oxidačnými číslami pri fyziologickom pH sú IV




Obr. 1. Štruktúrny vzorec auranofinu

a V. V súčasnosti je považovaný za esenciálny stopový prvok pre niektoré organizmy<sup>12</sup>. Vanád v bunke ovplyvňuje činnosť viacerých enzýmov (napr. ATPáz, fosfatáz, proteínkináz a ribonukleáz), ako aj nimi riadených signálnych kaskád. Má osobitný význam v metabolizme určitých druhov organizmov<sup>13</sup>, vyskytuje sa napr. v nitrogenázach pôdných baktérií (*Azotobacter*) alebo v rôznych haloperoxidázach katalyzujúcich oxidáciu halogenidov peroxidom vodíka za vzniku organických halogenderivátov. Niektoré organizmy akumulujú vanád vo forme komplexných zlúčenín. Vzhľadom k relatívne vysokému zastúpeniu v morskej vode sa jedná najčastejšie o morské organizmy, ako sú ascídie (*Ascidia*) a plášťovce (*Tunicata*), ale vo forme amavadinu, oktakoordinovaného komplexu štvormocného vanádu, sa vyskytuje aj v niektorých hubách, napr. v muchotrávke červenej (*Amanita muscaria*).

Zlúčeniny vanádu vykazujú viaceré druhy farmakologickej aktivity<sup>14</sup>. Už pomerne veľmi skoro (koniec 19. storočia) bola rozpoznaná ich biologická aktivita, keď bol skúmaný vplyv perorálne podávaných vanadičnanov na rôzne ochorenia, medzi nimi aj na *diabetes mellitus*<sup>15</sup>. Ukázalo sa, že zlúčeniny vanádu v oxidačnom stupni V spôsobujú zníženie hladiny glukózy v krvi u pacientov. V nasledujúcich desaťročiach antidiabetická aktivita komplexov vanádu upadla na dlhú dobu do zabudnutia a bola znovu objavená až v 90. rokoch 20. storočia v súvislosti s testovaním látok účinných v terapii diabetu 2. typu. Tento typ diabetu je charakteristický zníženou odozvou buniek na prísun inzulínu (toleranciou), následne vedúcou k strate účinnosti externej suplementácie inzulínu.

Zlúčeniny vanádu nemôžu úplne nahradiť nedostatok inzulínu v diabete 1. typu, avšak môžu znížiť jeho potrebu a potenciálne aj nahradiť hypoglykemiká používané pri diabete 2. typu. Vzhľadom k svojej aktivite, podobnej účinku inzulínu, sa nazývajú tiež inzulínové mimetiká. Dôležitým zistením bolo, že komplexy vanádu obsahujúce organické ligandy vykazujú vo všeobecnosti vyššiu efektivitu než anorganické (iónové) soli vanádu. Nevýhodou jednoduchých anorganických zlúčenín vanádu (síran vanadylu, vanadičnan amónny) je nízka resorpcia z tráviaceho traktu po perorálnej administrácii, čo vedie k potrebe použitia pomerne vysokých dávok<sup>16</sup>. V pokusoch na zvieratách sa ukázalo, že v prípade jednorázovej dávky síranu vanadylu ( $\text{VOSO}_4$ ) dochádza k gastrointestinálnej resorpcii len asi 10 % látky. Následkom



Obr. 2. Štruktúra komplexu vanádu BMOV

vyšších dávok potrebných na dosiahnutie terapeutického účinku boli tiež pozorované prípady podráždenia tráviaceho traktu u pacientov. Cieľom ďalšieho výskumu bol preto vývoj komplexných zlúčenín vanádu s vhodnými organickými ligandmi, umožňujúcimi zlepšenie resorpciu z tráviaceho traktu. Zatiaľ najúspešnejšími z týchto komplexov sú bis(maltolato)-oxidovanadičtý komplex (BMOV) a bis(etylmaltolato)-oxidovanadičtý komplex (BEOV)<sup>16</sup> (obr. 2). Druhá z uvedených látok sa dostala do II. štádia klinického skúmania, hoci klinický výskum ešte nie je ukončený. Miera resorpcie z tráviaceho traktu dosahuje až trojnásobok v porovnaní s  $\text{VOSO}_4$ , teda okolo 30 %.

Vzhľadom k tomu, že zlúčeniny vanádu sú schopné interagovať s mnohými signálnymi dráhami v bunke, je mechanizmus ich biologickej aktivity komplexný a nie úplne preskúmaný<sup>17</sup>. V konkrétnom prípade ich antidiabetického účinku je možné uvažovať dva hlavné spôsoby účinku, v závislosti od oxidačného stupňa vanádu. Kým v prípade päťmocného vanádu prevažuje vnútrobunková aktivita, najmä vplyv na metabolizmus glukózy a lipidov, štvormocný vanád účinkuje prevažne v krvnej plazme, inhibíciou lipolýzy a aktiváciou transportu glukózy cez plazmatickú membránu. Celkovo je možné konštatovať, že zlúčeniny vanádu v oxidačnom stupni IV sú terapeuticky účinnejšie než zodpovedajúce komplexy v oxidačnom stupni V alebo III. Na druhej strane oxidačné stupne IV a V sú energeticky blízke a je možná ich vzájomná premena za fyziologických podmienok v bunke. Vanadičnanový anión (spravidla vo forme  $\text{H}_2\text{VO}_4^-$ ) je z hľadiska svojej geometrie (tetraéder), elektrónovej štruktúry a čiastočne tiež chemických vlastností, analógom fosforečnanového aniónu ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ). Vanadičnanový anión má preto schopnosť zastupovať fosforečnan v enzýmoch regulovaných týmto aniónom a príslušných signálnych kaskádach.

U komplexov typu BEOV dochádza pomerne skoro po ich resorpcii v tráviacom trakte k disociácii na  $\text{VO}^{2+}$  a voľný ligand. Katión vanadylu následne vytvára stabilný adukt so sérovým transferínom a v tejto podobe je potom vanád transportovaný do rôznych tkanív. Pritom dochádza k reverzibilnej akumulácii vanádu v kostnom tkanive, ktoré slúži ako zásobáreň (depot) vanádu, a predlžuje tak jeho biologický polčas v organizme.

Hlavným mechanizmom antidiabetického účinku vanádu sa javí byť inhibícia proteínovej tyrozinofosfatázy (PTPázy). PTPáza zohráva významnú úlohu v regulácii prísunu glukózy do bunky prostredníctvom glukózového transportéra. Tento transportér je aktivovaný väzbou inzulínu na inzulínový receptor nachádzajúci sa v bunkovej membráne, v dôsledku ktorej dochádza k fosforylácii tyrozinu v bunke. V neprítomnosti inzulínu je glukózový transportér inhibovaný účinkom PTPázy, zabraňujúcej autofosforylácii. Vanadičnanový ión je schopný koordinácie v aktívnom centre PTPázy, čo vedie k inhibícii tohoto enzýmu, následne k spusteniu autofosforylácie a iniciácii transportu glukózy do bunky.

Počas klinických štúdií demonštrovali viaceré zlúčeniny vanádu pozitívny vplyv na metabolizmus glukózy.

Typická denná dávka komplexu BEOV v priebehu fázy II klinického skúmania bola 20 mg. Prejavy systémovej toxicity v priebehu klinických experimentov boli minimálne. Napriek tomu treba podotknúť, že publikované klinické štúdie boli realizované na malom počte dobrovoľníkov s pomerne krátkym trvaním a z tohoto dôvodu sa skúmané komplexy zatiaľ nepresadili v klinickej praxi<sup>18)</sup>. Napriek týmto čiastočným úspechom teda pokračuje výskum nových zlúčenín s antidiabetickým účinkom, s cieľom pripraviť komplexy vanádu s vyššou aktivitou, ako aj klinické štúdie známych komplexov za účelom spresnenia údajov o ich účinnosti, mechanizme farmakologickej aktivity a možnej toxicite. Anorganické soli vanádu taktiež našli použitie v komplementárnej liečbe diabetes a v rôznych výživových doplnkoch.

Antidiabetický účinok bol pozorovaný aj u zlúčenín niektorých iných prechodných kovov, najmä chrómu, molybdénu, wolfrámu a zinku<sup>19)</sup>. Vyššie dávky komplexov chrómu (v oxidačnom stupni III) pôsobia pozitívne na metabolizmus glukózy. V prípade komplexu chrómu s pikolinátovými ligandmi bola zhruba u polovice pacientov trpiacich diabetom 2. typu pozorovaná terapeutická účinnosť<sup>20)</sup>. Okrem znižovania hladiny glukózy v krvi majú chromité komplexy aj vplyv na metabolizmus lipidov. Napriek týmto výsledkom je použitie zlúčenín chrómu kontroverzné, vzhľadom k ich možnému mutagénemu a teratogénemu účinku. Zlúčeniny molybdénu a wolfrámu sú účinné vo forme zodpovedajúcich molybdénanových, resp. wolfrámanových aniónov, hoci ich efekt je podstatne menej preskúmaný v porovnaní so zlúčeninami vanádu či chrómu (iba preklinické štúdie). V pokusoch na zvieratách bola dokázaná taktiež účinnosť komplexov zinku pri diabete 2. typu. Výhodou komplexov uvedených kovov je ich relatívne nižšia toxicita v porovnaní so zlúčeninami chrómu.

### Lítium v liečbe psychických ochorení

Využitie zlúčenín lítia predstavuje zásadný pokrok v liečbe niektorých psychických ochorení a napriek nástupu moderných psychofarmák zohráva naďalej významnú úlohu v terapii. Je nutné zdôrazniť, že v prípade týchto zlúčenín sa nejedná o koordinačné zlúčeniny (komplexy kovov), ale o jednoduché soli (podobne ako u niektorých iných zlúčenín uvedených v tomto prehľade). Tematicky sa však spadá pod medicínsku anorganickú chémiu, vzhľadom k tomu, že pre biologický účinok je určujúca prítomnosť kovu a až v druhom rade jeho väzbový charakter.

Lítium je alkalický kov s relatívne jednoduchou chémiou, vyskytujúci sa v prírode len vo forme svojich zlúčenín. Nachádza sa v malých množstvách vo všetkých druhoch živých organizmov, kde však nemá žiadnu preukázateľnú fyziologickú funkciu. Mnohé minerálne vody obsahujú lítium, aj keď jeho koncentrácia je spravidla nízka. Svojimi vlastnosťami sa podobá ostatným alkalickým kovom. Podobne ako tieto tvorí jednomocný kation, hoci na rozdiel od nich vytvára väzby s pomerne výrazným podielom kovalentnosti. Lítový kation má mi-

moriadne malý iónový polomer a vysokú hustotu náboja, čo spolu s rozsiahlou hydratačnou sférou vedie k nízkej iónovej mobilite lítia vo vodnom roztoku. Vzhľadom k diagonálnej podobnosti v rámci periodickej sústavy prvkov vykazuje niektoré analógie s horčíkom (napr. podobný atómový a iónový polomer) a čiastočne tiež s vápnikom. Na základe tejto podobnosti môže interagovať so signálnymi dráhami v organizme sprostredkovanými horčíkom a vápnikom.

Lítium bolo objavené v roku 1817 a už v nasledujúcich desaťročiach dochádza k prvým pokusom o jeho využitie v terapii<sup>21)</sup>. Lítová soľ kyseliny močovej vykazuje značnú rozpustnosť vo vode, ako jedna z mála solí tejto kyseliny. Na základe tohoto pozorovania bola snaha dosiahnuť podávaním solí lítia rozpustenie depozitov kyseliny močovej, vznikajúcich v dôsledku dny (*arthritis urica*), zápalového ochorenia kĺbov<sup>22)</sup>. Následne bolo lítium aplikované v terapii ďalších ochorení, ako sú reumatizmus, infekcie, obličkové kamene a podobne, avšak bez systematického experimentálneho základu. V roku 1886 zverejnil dánsky fyziológ monografiu pojednávajúcu o depresii a jej terapii<sup>23)</sup>. V tejto práci popísal aj použitie prípravkov obsahujúcich lítium v liečbe recidivujúcej depresívnej poruchy. Väčšina týchto aplikácií sa však zakladala na mylnej domnienke o hromadení kyseliny močovej v organizme ako základnej príčiny liečených ochorení a o ľahšom vylučovaní tejto kyseliny z tela vo forme jej lítnej soli. V dôsledku vyvrátenia tejto hypotézy dochádza neskôr k ústupu použitia zlúčenín lítia v terapii.

Dejiny využitia lítia v modernej terapii začínajú koncom 40. rokov 20. storočia, keď publikoval austrálsky psychiater John Cade prvé práce o vplyve lítia na priebeh depresie a bipolárnej poruchy<sup>24)</sup>. V priebehu experimentov na zvieratách aplikoval lítovú soľ kyseliny močovej morčatám a pozoroval upokojujúci účinok a zníženie dráždivosti bez sedatívneho efektu. Neskôr zistil rovnaký účinok aj pri použití uhličitanu lítneho, z čoho usúdil, že farmakologický účinok je viazaný na lítium, nie na kyselinu močovú. Na základe týchto uzáverov pristúpil následne k testovaniu uhličitanu lítneho na psychiatrických pacientoch trpiacich manickou epizódou bipolárnej poruchy, pričom zaznamenal všeobecný ústup symptómov.

Použitie lítia v terapii bipolárnej poruchy a depresie sa spočiatku presadzovalo len pomaly, predovšetkým kvôli nedostatočnej úrovni východiskových klinických štúdií a tiež vzhľadom na viaceré závažné prípady intoxikácie lítium, zaznamenané v tomto období. Situáciu zmenili až následné podrobné klinické a toxikologické štúdie, napr. práce dánskych lekárov Baastrup, Ström-grena a Schoua<sup>25)</sup>. V priebehu týchto štúdií bola dostatočne preukázaná efektívnosť lítia v liečbe depresie a bipolárnej poruchy (manických aj depresívnych epizód). V ďalšom období boli uskutočnené aj pokusy o rozšírenie aplikácie zlúčenín lítia aj na terapiu iných psychických ochorení, avšak výsledky ukázali podstatne nižšiu účinnosť.

Dnes sú zlúčeniny lítia všeobecne používané v terapii depresie a bipolárnej afektívnej poruchy (manických aj depresívnych epizód), a taktiež schizofrénie<sup>21)</sup>. Sú klasi-




fikované ako tzv. stabilizátory nálady<sup>26)</sup>. Ich obzvlášť cenovým účinkom je zníženie incidencie suicídu pri týchto ochoreniach, považovaný za unikátnu vlastnosť liečiv na báze lítia. Sú aplikované perorálne, najčastejšie ako uhličitan lítny, pričom celková dávka môže dosahovať až 2 g/deň. Vzhľadom k pomerne úzkemu terapeutickému rozmedziu lítia musí byť jeho dávkovanie starostlivo kontrolované. Štandardne sa používa monitorovanie hladiny lítia v krvi 12 h po administrácii liečiva. V počiatočných aplikáciách bolo lítium používané v terapii akútnych fáz ochorenia s použitím vyšších dávok lítia, neskôr sa začalo aplikovať dlhodobo v menších dávkach v rámci profylaxie. Lítium vykazuje celý rad nežiadúcich účinkov, obzvlášť pri prekročení odporúčanej dávky<sup>27, 28)</sup>. Patria k nim napr. ovplyvnenie funkcie štítnej žľazy, zvýšenie telesnej hmotnosti, tremor, nevoľnosť, diareja a ataxia. Pri dlhodobom používaní vyšších dávok liečiva môže dôjsť k poškodeniu obličiek. Vzhľadom k širokému spektru nežiadúcich účinkov bolo terapeutické použitie zlúčenín lítia po dlhú dobu kontroverzné. Na druhej strane jeho nespornou výhodou je jeho nízka cena a všeobecná dostupnosť ako generikum.

Lítium je po perorálnej aplikácii vo veľkej miere resorbované a následne distribuované do všetkých orgánov tela. Zvýšená akumulácia lítia v tele je pozorovaná najmä v endokrinných žľazách, napr. v hypofýze a štítnej žľaze, a taktiež v kostiach. V organizme interaguje s mnohými biochemickými procesmi a súčasťami bunky, preto je identifikácia potenciálneho farmakologického mechanizmu a miesta účinku mimoriadne komplikovaná<sup>29)</sup>. Biologická aktivita lítneho kationu môže byť spojená s jeho analógiou s horčíkom, resp. s vápnikom, napr. v enzýmoch aktivovaných horečnatými kationmi. Lítium interferuje s metabolizmom fosfatidylinozitolov, pričom akompetitívne inhibuje inozitolmonofosfatázu. V dôsledku toho dochádza k zníženiu koncentrácie myoinozitolu v bunkách, čo môže byť príčinou nižšej odozvy mozgu na vonkašie stimuly.

Okrem vyššie uvedeného použitia sú v súčasnosti predmetom výskumu aj aplikácie lítia v terapii ďalších ochorení<sup>30)</sup>. Ako príklad môžeme uviesť neuroprotektívne účinky lítia (Alzheimerova choroba), potenciáciu imunitnej odpovede, antivirálne účinky, topikálne aplikácie v liečbe kožných ochorení (napr. seboroická dermatída) a pod.

### Chelatačná terapia

Chelatačná terapia sa odlišuje od iných aplikácií komplexov kovov vo farmácii, keďže pri nej nedodávame do



Obr. 3. Štruktúra DMSA (kyseliny dimerkaptojantárovej)

organizmu kovy, ale naopak, odstraňujeme ich<sup>31)</sup>. V rámci tejto terapie aplikujeme vhodné ligandy, ktoré vytvárajú *in vivo* stabilné komplexy s kovmi a v tejto forme môžu byť následne z organizmu vylúčené. Klasickou aplikáciou chelatačnej terapie je odstraňovanie toxických kovov pri otravách, najmä tzv. „ťažkými“ kovmi. Ako príklady môžeme uviesť intoxikácie zlúčeninami olova, ortuti, arzenu či železa. V závislosti od druhu chelatačného činidla, toxického kovu, ako aj charakteru otravy môžu byť tieto liečivá aplikované perorálne, intravenózne alebo intramuskulárne.

Počiatky chelatačnej terapie siahajú do medzivojnového obdobia a súvisia s objavom kyseliny etyléndiaminotetraoctovej (EDTA), látky tvoriacej mimoriadne stabilné komplexy s iónmi kovov. K ďalšiemu rozvoju dochádza v priebehu 2. svetovej vojny v dôsledku hľadania vhodných antidot (protijedov) pri intoxikáciách chemickými bojovými látkami, najmä lewisitom (bojová látka obsahujúca arzén)<sup>32)</sup>. Výsledkom výskumu bol dimerkaprol, 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol (BAL – British anti-Lewisite). Neskôr sa ukázalo, že táto látka vykazuje značnú účinnosť pri otravách olovom.

V nasledujúcom období bola aplikácia dimerkaprolu rozšírená aj na liečbu otráv inými kovmi. Časom sa však ukázalo, že takáto terapia môže viesť k viacerým nežiadúcim účinkom, často aj so závažným priebehom (v niektorých prípadoch dokonca letálnym). Medzi príčinami vysokej toxicity dimerkaprolu môže byť aj jeho výrazný lipofilný charakter, preto boli skúmané ďalšie chelátory s hydrofilnejšími vlastnosťami<sup>33, 34)</sup>. Medzi tieto látky patria napr. **kyselina dimerkaptojantárová** (DMSA) (obr. 3) a dimerkaptopropánsulfónová (DMPS), vykazujúce podstatne nižšiu toxicitu. Samotná EDTA je napriek svojmu hydrofilnému charakteru pri intravenózne administrácii vysoko toxická, čo môže byť spôsobené (podobne ako aj u dimerkaprolu) tendenciou k mobilizácii kovov v pôvodných miestach depozície a ich transportu (ako komplexov) do iných tkanív a orgánov, napr. do mozgu.

Zlúčeniny vhodné ako ligandy pre chelatačnú terapiu by mali spĺňať viaceré podmienky:

- vysoká afinita k toxickému kovu – donorové atómy by mali vykazovať zodpovedajúcu tvrdosť alebo mäkkosť voči tvrdým/mäkkým centrálnym atómom kovov v zmysle teórie HSAB
- nízka toxicita
- vhodná farmakokinetika
- výsledný chelát vykazuje rýchlu elimináciu/detoxikáciu
- vyššia afinita voči toxickým kovom v porovnaní s esenciálnymi kovmi v organizme
- nemali by podporovať redistribúciu toxických kovov do iných orgánov

Pri otravách olovom sa často využíva kombinácia EDTA (najmä vo forme  $\text{CaNa}_2\text{EDTA}$ ) s lipofilnejšími chelátormi, napr. s BAL. EDTA je tiež prvou voľbou pri otravách kadmiumom. V prípade intoxikácie zlúčeninami ortuti sú používané najmä DMSA a DMPS.

Chelatačná terapia má tiež značný význam v terapii metabolických ochorení vyznačujúcich sa narušením ho-

meostázy kovových prvkov v organizme<sup>35</sup>). Tieto ochorenia majú väčšinou genetický základ a vedú k nadmernej akumulácii kovových prvkov v bunkách. Pri Wilsonovej chorobe sa jedná o poruchu transportu medi, ktorá má za následok akumuláciu tohto prvku v niektorých orgánoch, predovšetkým v pečeni a mozgu<sup>36</sup>). Typickým príznakom ochorenia je ukladanie medi v očnej rohovke. Najčastejšie aplikovaným chelátorom pri Wilsonovej chorobe je D-penicilamín, často v kombinácii so soľami zinku, ktoré inhibujú intestinálnu resorpciu medi.

Dedičným ochorením je i hemochromatóza, charakteristická zvýšenou intestinálnou resorpciou železa a jeho nadmernou akumuláciou v tkanivách, napr. v pečeni a pankrease. Ďalšími ochoreniami prejavujúcimi sa hyperakumuláciou železa sú  $\beta$ -talasémia, kosáčikovitá anémia a ďalšie poruchy metabolizmu hemoglobínu. Vzhľadom k nízkej exkrécii železa z organizmu vedie jeho nadmerná akumulácia v konečnom dôsledku k zlyhaniu dôležitých orgánov a k smrti<sup>37</sup>). Štandardnou chelatačnou terapiou pri týchto ochoreniach je podávanie deferoxamínu, prírodného liečiva izolovaného z huby *Streptomyces pilosus*. Vzhľadom k svojej nízkej biodostupnosti musí byť aplikovaný formou subkutánnej infúzie.

Chelatačná terapia by mohla predstavovať potenciálny prínos aj v liečbe Alzheimerovej choroby<sup>35</sup>). Pri tomto ochorení dochádza k akumulácii viacerých kovov (najmä medi, železa a zinku) v neuropiloch mozgu, obzvlášť v depozitoch amyloidu, čo vedie k nárastu oxidatívneho stresu a poškodeniu tkanív. Dôležitou vlastnosťou potenciálnych chelátorov je v takomto prípade schopnosť preniknúť hematoencefalickou bariérou. Napriek viacerým pozitívnym výsledkom je táto aplikácia stále v štádiu výskumu, podobne ako antineoplastická terapia založená na redukcii množstva železa dostupného rakovinovým bunkám<sup>38</sup>).


Kontroverznou oblasťou využitia chelatačnej terapie je liečba aterosklerózy, založená na predpoklade odstraňovania depozitov vápnika z koronárnych artérií. Podobne spornou je aj terapia autizmu aplikáciou chelatačných činidiel, ktorej terapeutický benefit nebol potvrdený v klinickej praxi. Napriek istej popularite tejto terapie v alternatívnej medicíne je jej použitie značne rizikové, vzhľadom k tomu, že najčastejšie sa ako chelátor aplikuje EDTA vykazujúca množstvo závažných nežiadúcich účinkov<sup>39</sup>). Na druhej strane niektoré publikované výsledky výskumu naznačujú reálny klinický prínos chelatačnej terapie v liečbe kardiovaskulárnych ochorení (infarkt myokardu a pod.)<sup>40</sup>).

### Niektoré ďalšie oblasti aplikácie kovov vo farmakoterapii

K aktuálnym témam výskumu metalofarmák patrí ich inhibičná aktivita voči mnohým enzýmom<sup>41</sup>). Komplexy kovov ako inhibítory enzýmov vykazujú viaceré vlastnosti odlišné od čisto organických inhibítorov. Boli tu už spomenuté inhibítory ureázy typu komplexných zlúčenín kovov, antidiabetické zlúčeniny vanádu ako

inhibítory proteintyrozínfosfatáz, ako aj zlúčeniny kovov s protinádorovým účinkom, ktorých aktivita súvisí s inhibíciou niektorých enzýmov. Spomedzi viacerých ďalších enzýmov inhibovaných zlúčeninami kovov stojí za zmienku inhibícia  $\beta$ -laktamáz, enzýmov s centrálnym významom pri rozvoji získanej rezistencie mikroorganizmov voči  $\beta$ -laktámovým antibiotikám (napr. penicilínom a karbapenemom). Tieto antibiotiká patria k základnému arzenálu antibakteriálnej chemoterapie a ich účinnosť je v posledných desaťročiach čoraz viac znižovaná výskytom rezistencie, spôsobenej najmä zvýšenou expresiou  $\beta$ -laktamáz, schopných katalyzovať hydrolyzu štvorčlenného  $\beta$ -laktámového kruhu. V súvislosti s týmto javom sa v čoraz vyššej miere presadzuje kombinačná terapia, pri ktorej sú spolu s  $\beta$ -laktámovými antibiotikami podávané tiež inhibítory  $\beta$ -laktamáz. Medzi najúčinnšie takéto inhibítory patria rôzne deriváty alkylboritých kyselín, napr. **vaborbaktám** (obr. 4), cyklický monoester alkylboritej kyseliny, ktorý našiel uplatnenie v klinickej praxi v kombinácii s antibiotikom meropenémom<sup>42</sup>). Alkylborité zlúčeniny majú často širšie spektrum účinnosti, t. j. sú účinné aj pri  $\beta$ -laktamázach, odolných voči čisto organickým inhibítorm, ako je napr. kyselina klavulanová. Samotný vaborbaktám nevykazuje antibiotické účinky, vo vývoji sú však ďalšie organoborité zlúčeniny, ktoré spájajú inhibíciu  $\beta$ -laktamáz s antimikróbnou aktivitou.

Oxid dusnatý (NO) zohráva významnú úlohu vo viacerých biochemických procesoch. Je súčasťou signálnych dráh zapojených do regulácie fyziologických dejov v organizme, napr. riadi vazodilatáciu (rozšírenie ciev) v kardiovaskulárnom systéme. Jeho nadbytok môže viesť k závažným patofyziologickým javom, ako je hypotenzia, prípadne až kardiovaskulárny kolaps. V takom prípade by mohlo byť zmysluplné podávanie komplexov kovov schopných viazať oxid dusnatý. Naopak, ak je žiaduca zvýšená vazodilatácia, je vhodné použitie liečiv – donorov oxidu dusnatého. Medzi takéto látky patria aj komplexy niektorých kovov obsahujúce ako ligand oxid dusnatý, tzv. nitrozylové komplexy. Najčastejšie sa jedná o komplexy kovov, ako sú ruténium<sup>43</sup>) či železo. V klinickej praxi je už dlhodobo etablovaným liečivom **nitroprusid sodný**, pentakyanido-nitrozylželezitan sodný (obr. 5), používaný na radikálne zníženie krvného tlaku pri niektorých indikáciách<sup>44</sup>). Jeho výhodou je veľmi rýchly nástup účinku. Je aplikovaný pomocou intravenózneho infúzie. Problémom pri jeho použití je čiastočná disociácia




Obr. 4. Štruktúra vaborbaktámu

cia komplexu *in vivo* a uvoľňovanie kyanidových iónov do okolitého prostredia, prejavujúcich toxické účinky najmä pri vyššej koncentrácii liečiva. Z tohoto dôvodu prebieha výskum ďalších nitrozylových komplexov, neobsahujúcich kyanidové ligandy.

Reaktívne formy kyslíka, medzi ktorými zaujíma prominentné miesto superoxidový (hyperoxidový) anión-radikál  $O_2^-$ , sú vedľajšími produktmi normálneho metabolizmu a ich hladina je trvale udržiavaná na nízkej úrovni prostredníctvom bunkových detoxikačných mechanizmov. Za istých okolností, ako napríklad v prípade infarktu myokardu a iných patologických stavov, však môže dochádzať k zvýšeniu koncentrácie superoxidu a v dôsledku toho k následnému poškodeniu okolitých tkanív týmto vysokoreaktívnym radikálom. Superoxid je tiež spájaný s patogenézou ochorení, ako sú reumatoidná artritída, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Základom bunkovej detoxikácie superoxidu je jeho premena na peroxid vodíka a molekulový kyslík za katalýzy enzýmom superoxididizmutáza. Superoxididizmutáza je metaloenzým obsahujúci v svojom aktívnom centre ióny kovov, ktoré majú zásadný význam pre jeho katalytickú funkciu. V závislosti od konkrétnej kategórie superoxididizmutázy sa jedná hlavne o meď spolu so zinkom (v cytosóle väčšiny eukaryotických buniek), prípadne o mangán alebo železo (v mitochondriách eukaryotov, ako aj u nižších organizmov). V súčasnosti prebieha výskum funkčných mimetik tohoto enzýmu, t. j. komplexov vyššie uvedených kovov (najmä Cu, Mn a Fe) vykazujúcich analogickú aktivitu ako superoxididizmutáza<sup>45, 46</sup>. Cieľom je príprava katalyticky aktívnych komplexov s vysokou aktivitou a selektivitou pre tento typ reakcie. Nemenej dôležitými sú i nízka toxicita a vhodná farmakokinetika potenciálneho liečiva. Z tohoto dôvodu nie je vhodné použitie jednoduchých solí kovov, napriek tomu, že predovšetkým voľný meďnatý kation (t. j. akvakomplex medi) je veľmi aktívnym katalyzátorom dizmutácie superoxidových radikálov. Vzhľadom k zložitosti štruktúry aktívneho centra samotnej superoxididizmutázy je imitácia jeho štruktúry pomocou komplexných zlúčenín taktiež problematická. V súčasnosti sa ako najslubnejšie mimetiká superoxididizmutázy javia komplexy mangánu.

Špecifickým typom biologicky aktívnych zlúčenín kovov sú polyoxometaláty – klastre tvorené prechodnými kovmi vo vysokých oxidačných stupňoch (najmä V, Mo a W), premostenými navzájom atómami kyslíka<sup>47</sup>. Tieto



Obr. 5. Štruktúra komplexného aniónu nitroprusidu sodného

klastre nesú spravidla záporný náboj. Polyoxometaláty vytvárajú veľmi pestrú paletu trojrozmerných štruktúr pozostávajúcich z rôzne usporiadaných základných polyédrov. Prvá takáto látka, fosfomolybdénan amónny, bola objavená už v roku 1826, avšak k rozvoju prípravy a aplikácie polyoxometalátov dochádza až relatívne nedávno. Tieto zlúčeniny majú množstvo zaujímavých potenciálnych použití, popri aplikáciách v katalýze či elektronike tiež rôzne druhy biologickej aktivity<sup>48</sup>, napr. antibakteriálnu, antivirálnu a antineoplastickú aktivitu. Predmetom výskumu je aj ich potenciálne využitie ako enzýmových mimetik<sup>49</sup>.

Zaujímavým aspektom interakcie kovov s biomolekulami je vplyv iónov kovov (predovšetkým medi a zinku) na bioaktivitu niektorých antibiotík<sup>50</sup>. K takejto interakcii dochádza buď priamou väzbou na molekuly antibiotík, alebo ovplyvnením bakteriálnej odozvy na antibiotiká (vznik rezistencie).

Ióny kovov sú rozšírenou súčasťou prírodného prostredia, či už z prírodných zdrojov, alebo ako dôsledok environmentálneho znečistenia (environmentálne stresory). Významným zdrojom je aj poľnohospodárstvo, vo forme aditív do krmív pre hospodárske zvieratá (Cu, Zn). Tieto kovy, napriek ich esenciálnemu charakteru, majú vo vyšších koncentráciách výrazný toxický účinok voči mikroorganizmom. Zvýšená expozícia buniek mikroorganizmov iónom kovov má za následok adaptáciu postihnutých buniek a aktiváciu mechanizmov rezistencie, najmä znížený príjem a zvýšený eflux kovov, ktoré sú z fyziologického aj genetického hľadiska príbuzné rezistenčným mechanizmom proti antibiotikám. Dôsledkom je teda zvýšená odolnosť mikroorganizmov voči obom stresorom – iónom kovov aj antibiotikám. Takto bola napríklad potvrdená závislosť medzi používaním krmív obohatených zinkom a zvýšeným výskytom meticilín-rezistentných kmeňov *Staphylococcus aureus* v hospodárskych zvieratách<sup>51</sup>. Podobne sa uvádza spojitosť medzi meďou v krmivách a nárastom rezistencie proti glykopeptidovým a makrolidovým antibiotikám v rôznych enterokokových baktériách<sup>51</sup>. Tento jav predstavuje obzvlášť závažný problém vzhľadom k možnosti zoonózy – prenosu multirezistentných mikroorganizmov zo zvierat na človeka.

Ióny kovov môžu ovplyvňovať aktivitu antibiotík taktiež priamou koordináciou vo forme komplexných zlúčenín. Už od roku 1946 je známy fenomén inaktívácie penicilínu<sup>52</sup>, spôsobený koordináciou zinku na toto antibiotikum a následnou hydrolyzou jeho  $\beta$ -laktámového kruhu (podobný účinok bol pozorovaný aj u tetracyklínu). Podobne ako zinok aj meď vytvára komplexné zlúčeniny s radom antibiotík. Väčšinou pritom dochádza k zníženiu účinnosti použitých antibiotík, avšak tento efekt je kvalitatívne aj kvantitatívne závislý od druhu mikroorganizmu ako aj od samotného antibiotika. V niektorých prípadoch je možné pozorovať synergický efekt iónu kovu a antibiotika, teda lepšiu celkovú účinnosť terapie (napr. kombinácia zinku a karbapenemových, resp. fluorochinolónových antibiotík proti *Pseudomonas aeruginosa*)<sup>53</sup>.

## Záver

Výskum bioaktívnych komplexov kovov nadobúda čoraz väčší význam, o čom svedčí aj neustále rastúci počet vedeckých publikácií v tejto oblasti. Okrem najvýznamnejšej oblasti využitia metalofarmák – antimikróbnej a protinádorovej chemoterapie – stúpa počet aplikácií aj v ďalších oblastiach terapie, akými sú napríklad liečba diabetu, zápalových ochorení či inhibícia rôznych enzýmov. Komplexné zlúčeniny kovov majú spravidla výhodu špecifického mechanizmu účinku, odlišného od čisto organických liečiv, čo umožňuje v mnohých prípadoch dosiahnuť účinnosť aj v prípadoch ochorení rezistentných voči štandardnej terapii. Flexibilita štruktúrnych parametrov koordinačných zlúčenín taktiež umožňuje vo veľmi veľkej miere optimalizovať štruktúru týchto látok v zmysle analýzy závislosti štruktúra – biologická účinnosť. Na druhej strane, vzhľadom k inherentnej toxicite iónov mnohých kovov, vyvstáva potreba jej účinného obmedzenia vhodným výberom ligandov a spôsobu koordinácie. Všetky tieto faktory si do budúcnosti vyžadujú intenzívny interdisciplinárny výskum v oblasti chemickej syntézy (príprava nových metalofarmák) a analýzy (skúmanie štruktúry pripravených komplexov kovov, ich špeciácia *in vivo*), ako aj v oblasti biochémie a farmakológie (vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou, mechanizmy účinku, rezistencie a toxicity).

*Práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV, grant VEGA 1/0346/16.*

**Konflikt záujmov:** žiaden.

## Literatúra

- Raubenheimer H. G., Schmidbaur H. The late start and amazing upswing in gold chemistry. *J. Chem. Ed.* 2014; 91, 2024–2036.
- Faa G., Gerosa C., Fanni D., Lachowicz J. I., Nurchi V. M. Gold – old drug with new potentials. *Curr. Med. Chem.* 2018; 25, 75–84.
- Forestier R. L'aurothérapie dans les rhumatismes chroniques. *Bulletins et memoires de la Société medicale des hôpitaux de Paris* 1929; 44, 323–327.
- Forestier R. The treatment of rheumatoid arthritis with gold salts injections. *Lancet* 1932; 219, 441–444.
- Bullock J., Rizvi S. A. A., Saleh A. M., Ahmed S. S., Do D. P., Ansari R. A., Ahmed J. Rheumatoid arthritis: a brief overview of the treatment. *Med. Princ. Pract.* 2018; 27, 501–507.
- Naggar M. E., Shehadi I., Abdou H. E., Mohamed A. A. Gilded hope for medicine. *Inorganics* 2015; 3, 139–154.
- Kean W. F., Hart L., Buchanan W. W. Auranofin. *Br. J. Rheumatol.* 1997; 36, 560–572.
- Eisler R. Chrysotherapy: a synoptic review. *Inflamm. Res.* 2003; 52, 487–501.
- Brown C. L., Whitehouse M. W., Tiekink E. R. T., Bushell G. R. Colloidal metallic gold is not bio-inert. *Inflammopharmacology* 2008; 16, 133–137.
- Rovenský J., Rybár I., Mičková D., Žlnay D., Lukáč J., Poprac P. Farmakoterapeutické postupy pri reumatoidnej artritíde. *Via Pract.* 2005; 2, 66–74.
- Roder C., Thomson M. J. Auranofin: repurposing an old drug for a golden new age. *Drugs R. D.* 2015; 15, 13–20.
- Mukherjee B., Patra B., Mahapatra S., Banerjee P., Tiwari A., Chatterjee M. Vanadium – an element of atypical biological significance. *Toxicol. Lett.* 2004; 150, 135–143.
- Rehder D. The role of vanadium in biology. *Metallomics* 2015; 7, 730–742.
- Rehder D. Vanadium in health issues. *ChemTexts* 2018; 4, 1–7.
- Lyonett B., Martz M., Martin E. L'emploi thérapeutique des dérivés du vanadium. *La Presse Médicale* 1899; 32, 191–192.
- Thompson K. H., Lichter J., LeBel C., Scaife M. C., McNeill J. H., Orvig C. Vanadium treatment of type 2 diabetes: A view to the future. *J. Inorg. Biochem.* 2009; 103, 554–558.
- Pessoa J. C., Etcheverry S., Gambino D. Vanadium compounds in medicine. *Coord. Chem. Rev.* 2015; 301–302, 24–48.
- Scior T., Guevara-Garcia J. A., Do Q.-T., Bernard P., Laufer S. Why antidiabetic vanadium complexes are not in the pipeline of “Big Pharma” drug research? A critical review. *Curr. Med. Chem.* 2016; 23, 2874–2891.
- Levina A., Lay P. A. Metal-based anti-diabetic drugs: advances and challenges. *Dalton Trans.* 2011; 40, 11675–11686.
- Wang Z. Q., Cefalu W. T. Current concepts about chromium supplementation in type 2 diabetes and insulin resistance. *Curr. Diabetes Rep.* 2010; 10, 145–151.
- Bauer M., Gitlin M. *The Essential Guide to Lithium Treatment*. Springer International Publishing Switzerland 2016.
- Garrod A. B. *The Nature and Treatment of Gout and Rheumatic Gout*. London: Walton and Maberly 1859.
- Lange C. *Om Periodisk e Depressionstilstande og deres Patogenese*. Copenhagen: Jacob Lunds Forlag 1886.
- Cade J. F. Lithium salts in the treatment of psychotic excitement. *Med. J. Aust.* 1949; 2, 349–351.
- Baastrop P. C., Schou M. Lithium as a prophylactic agent: its effect against recurrent depression and manic-depressive psychosis. *Arch. Gen. Psychiatry* 1967; 16, 162–172.
- Herman E., Praško J., Hovorka J. Místo stabilizátorů náhlých v léčbě bipolární poruchy. *Psychiat. pro Praxi* 2006; 4, 161–164.
- Makara-Studzińska M., Koślak A., Moryłowska-Topolska J., Urbańska A. Lithium therapy – the effectiveness of the medicine, side symptoms, complications and their influence on the quality of the life in affective diseases. *J. Elementol.* 2010; 15, 393–403.
- Vířčík E., Rusínová E. Vedľajšie účinky liečby lítium, ich mechanizmy a zvládnutie. *Čes. a slov. Psychiat.* 2005; 101, 36–39.
- Birch N. J. Inorganic pharmacology of lithium. *Chem. Rev.* 1999; 99, 2659–2682.
- Kielczykowska M., Musik I. Lithium and the application of its compounds in different fields of medicine. *J. Elementol.* 2014; 19, 1167–1178.
- Crichton R., Ward R. J., Hider R. C. (ed.) *Metal Chelation in Medicine*. Cambridge: Royal Society of Chemistry 2017.
- Baran E. J. Chelation therapies: A chemical and biochemical perspective. *Curr. Med. Chem.* 2010; 17, 3658–3672.
- Aaseth J., Skaug M. A., Cao Y., Andersen O. Chelation in metal intoxication – principles and paradigms. *J. Trace Elem. Med. Biol.* 2015; 31, 260–266.
- Kim J.-J., Kim Y.-S., Kumar V. Heavy metal toxicity: an update of chelating therapeutic strategies. *J. Trace Elem. Med. Biol.* 2019; 54, 226–231.



35. **Scott L. E., Orvig C.** Medicinal inorganic chemistry approaches to passivation and removal of aberrant metal ions in disease. *Chem. Rev.* 2009; 109, 4885–4910.
36. **Litwin T., Dusek P., Skowrońska M., Czlonkowska A.** Treatment of Wilson's disease – an update. *Expert Opin. Orphan Drugs* 2019; 7, 287–294.
37. **Nurchi V. M., Crisponi G., Lachowicz J. I., Medici S., Peana M., Zoroddu M. A.** Chemical features of in use and in progress chelators for iron overload. *J. Trace Elem. Med. Biol.* 2016; 38, 10–18.
38. **Yu Y., Gutierrez E., Kovacevic Z., Saletta F., Obeidy P., Suryo Rahmanto Y., Richardson D. R.** Iron chelators for the treatment of cancer. *Curr. Med. Chem.* 2012; 19, 2689–2702.
39. **Crisponi G., Nurchi V. M., Lachowicz J. I., Crespo-Alonso M., Zoroddu M. A., Peana M.** Kill or cure: misuse of chelation therapy for human diseases. *Coord. Chem. Rev.* 2015; 284, 278–285.
40. **Moreno C. R., Navas-Acien A., Escolar E., Nathan D. M., Newman J., Schmedtje J. F., Diaz D., Lamas G. A., Fonseca V.** Potential role of metal chelation to prevent the cardiovascular complications of diabetes. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2019; 104, 2931–2941.
41. **Kilpin K. J., Dyson P. J.** Enzyme inhibition by metal complexes: concepts, strategies and applications. *Chem. Sci.* 2013; 4, 1410–1419.
42. **Krajnc A., Lang P. A., Panduwawala T. D., Brem J., Schofield C. J.** Will morphing boron-based inhibitors beat the  $\beta$ -lactamases? *Curr. Opin. Chem. Biol.* 2019; 50, 101–110.
43. **Tfouni E., Truzzi D. R., Tavares A., Gomes A. J., Figueiredo L. E., Franco D. W.** Biological activity of ruthenium nitrosyl complexes. *Nitric Oxide* 2012; 26, 38–53.
44. **Friederich J. A., Butterworth J. F.** Sodium nitroprusside: twenty years and counting. *Anesth. Analg.* 1995; 81, 152–162.
45. **Riley D. P.** Functional mimics of superoxide dismutase enzymes as therapeutic agents. *Chem. Rev.* 1999; 99, 2573–2588.
46. **Salvemini D., Muscoli C., Riley D. P., Cuzzocrea S.** Superoxide dismutase mimetics. *Pulm. Pharmacol. Ther.* 2002; 15, 439–447.
47. **Hasenknopf B.** Polyoxometalates: introduction to a class of inorganic compounds and their biomedical applications. *Front. Biosci.* 2005; 10, 275–287.
48. **Rhule J. T., Hill C. L., Judd D. A., Schinazi R. F.** Polyoxometalates in medicine. *Chem. Rev.* 1998; 98, 327–358.
49. **van Rompuy, L. S., Parac-Vogt, T. N.** Interactions between polyoxometalates and biological systems: from drug design to artificial enzymes. *Curr. Opin. Biotech.* 2019; 58, 92–99.
50. **Poole K.** At the nexus of antibiotics and metals: the impact of Cu and Zn on antibiotic activity and resistance. *Trends Microbiol.* 2017; 25, 820–832.
51. **Yazdankhah S., Rudi K., Bernhoft A.** Zinc and copper in animal feed – development of resistance and co-resistance in antimicrobial agents in bacteria of animal origin. *Microb. Ecol. Health Dis.* 2014; 25, 25862.
52. **Eisner H., Porzecanski B.** Inactivation of penicillin by zinc salts. *Science* 1946; 103, 629–630.
53. **Elkhatib W., Noreddin A.** In vitro antibiofilm efficacies of different antibiotic combinations with zinc sulfate against *Pseudomonas aeruginosa* recovered from hospitalized patients with urinary tract infection. *Antibiotics (Basel)* 2014; 3, 64–84.