

# Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním léčiva pro terapii nespecifických střevních zánětlivých onemocnění z pohledu farmaceutické technologie

## Medicinal products with controlled drug release for local therapy of inflammatory bowel diseases from perspective of pharmaceutical technology

Kateřina Kubová

Došlo 27. května 2020 / Přijato 16. června 2020

### Souhrn

Cílem článku je představit základní design používaných léčivých přípravků s řízeným uvolňováním léčiva pro terapii nespecifických střevních zánětlivých onemocnění a objasnit jejich chování v gastrointestinálním traktu z pohledu farmaceutické technologie. Konkrétně se zaměřuje na přípravky s obsahem 5-aminosalicylové kyseliny (Asacol<sup>®</sup>, Pentasa<sup>®</sup>, Salofalk<sup>®</sup>) a budesonidu (Budenofalk<sup>®</sup>, Cortiment<sup>®</sup>, Entocort<sup>®</sup>). Součástí příspěvku jsou také základní doporučení a praktické informace, která lze využít v klinické praxi.

**Klíčová slova:** nespecifické střevní záněty • přívod léčiva do kolonu • zpožděné uvolňování léčiva • pH-dependentní polymery • tablety • pelety • tobolky • granule • matrice • obalování

### Summary

The aim of this article is to introduce the basic design of used medicinal products with controlled drug release for the treatment of inflammatory bowel diseases and to clarify their behaviour in gastrointestinal tract from the perspective of pharmaceutical technology. Specifically, it focuses on pharmaceutical drugs containing 5-aminosalicylic acid (Asacol<sup>®</sup>, Pentasa<sup>®</sup>, Salofalk<sup>®</sup>) and budesonide (Budenofalk<sup>®</sup>, Cortiment<sup>®</sup>, Entocort<sup>®</sup>). As a part of this paper, basic recommendations and practical information that can be used in clinical practice are also given.

**Key words:** inflammatory bowel diseases • colon targeting • delayed drug release • pH-dependent polymers • tablets • pellets • capsules • granules • matrix • coating

### Úvod

Základem pro popis funkce a chování lékových forem (LF) v gastrointestinálním traktu (GIT) je vysvětlení běžně používaných technologických pojmů. LF lze klasifikovat z několika hledisek. Podle počtu jednotek rozlišujeme jednotkové LF (např. tableta) nebo násobné LF (např. pelety nebo granule s řízeným uvolňováním léčiva). V případě, že jsou takové násobné lékové formy naplněny do tvrdé želatinové nebo hypromelosové (hydroxypropylmethylcelulosa – HPMC) tobolky, stále představují násobnou LF, protože tobolka se po spolknutí v prostředí žaludku rozpouští přibližně do 10 minut<sup>1)</sup>. Z hlediska struktury pak lze LF rozdělit na matricové, zásobníkové nebo kombinované, ve kterých se uplatňují oba přístupy.

**Matricový typ LF** pracuje jako jeden celek a zajišťuje zpravidla prodloužené uvolňování léčiva po určitý časový interval. Jedná se o homogenní směs léčiva, retardující pomocné látky (PL) a ostatních pomocných látek. Retardující pomocná látka hraje klíčovou úlohu v zajištění prodlouženého uvolňování léčiva (LČ). Jedná se zejména o hydrofilní bobtnající polymery, u kterých využíváme schopnost látky bobtnat a vytvářet na povrchu LF gelovou vrstvu, dále o lipofilní nosné PL (zejména vosky) a nerozpustné polymery (např. deriváty kyseliny methakrylové), které snižují penetraci tekutin v GIT do tablety<sup>2)</sup>. Jako příklad lze uvést např. hydrofilní gelovou matricovou tabletu. Jedná se o jednotkovou LF, která obsahuje hydrofilní bobtnající polymer. Ten vytváří gelovou vrstvu na povrchu tablety, která zajišťuje prodloužené uvolňování léčiva z tablety<sup>3)</sup>.

**Rezervoárový (zásobníkový) typ LF** je vždy tvořen jádrem s léčivem a polymerním obalem. Podobu zásobníku má např. obalená tableta, obalená peleta nebo obalená granule. Uvolňování léčivé látky podle povahy obalového materiálu probíhá na základě rozpouštění (např. změna rozpustnosti v závislosti na pH), difuze (nerozpustné obaly) nebo osmózy (nerozpustné a polopropustné obaly)<sup>4)</sup>.

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. (✉)

Ústav farmaceutické technologie

Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita

Palackého 1, 612 42 Brno

e-mail: kubovak@pharm.muni.cz

**Kombinovaný typ LF** pak funguje na principu obou výše zmíněných přístupů. Příkladem je matricová tableta obalená funkčním polymerním obalem.

V rámci terapie nespecifických střevních zánětlivých onemocnění se lze na našem trhu setkat s omezenou skupinou léčivých přípravků buď s obsahem 5-aminosalicylové kyseliny (Asacol<sup>®</sup>, Pentasa<sup>®</sup>, Salofalk<sup>®</sup>), nebo budesonidu (Budenofalk<sup>®</sup>, Cortiment<sup>®</sup>, Entocort<sup>®</sup>). Cílem tohoto příspěvku je objasnit základní strukturu LF používaných přípravků, přiblížit její fungování v GIT s ohledem na využití v současné farmakoterapii.

### Rozdělení přípravků dle LF

Na základě výše uvedeného „technologického minima“ lze rozdělit přípravky pro terapii nespecifických střevních zánětlivých onemocnění dle typu lékové formy. Rozdělení je souhrnně uvedeno v tabulce 1.

Z tabulky je jasně patrné, že matricový typ samostatně nelze v současné době využít pro přívod léčiva do distálních částí střeva a všechny používané přípravky jsou opatřeny funkčním obalem, který zajišťuje modifikaci uvolňování léčiva z LF. Pro zajištění prodlouženého uvolňování léčiva po rozpuštění obalu má jádro některých přípravků charakter matrice (Cortiment<sup>®</sup> tablety, Salofalk<sup>®</sup> granule). U přípravku Entocort<sup>®</sup> tobolky se jedná pouze o matricovou vrstvu, která výrazně neovlivňuje uvolňování léčiva (viz dále).

### Principy přívodu léčiva do distálních segmentů GIT

Ke směřování léčivých látek do distálních oblastí GIT se dnes využívá několik základních mechanismů<sup>5)</sup>.

Prvním přístupem je využití polymerů, které vykazují rozpustnost závislou na pH. Tento princip využívá fyziologické změny pH při průchodu lékové formy GIT. Přestože v literatuře lze nalézt různé hodnoty pH pro jednotlivé segmenty GIT, lze obecně shrnout, že hodnota pH se v oblasti žaludku pohybuje v poměrně širokém intervalu 1,2–5 (v závislosti na příjmu potravy), v tenkém střevě (duodenum, jejunum a ileum) dochází ke kontinuálnímu nárůstu pH v intervalu 5,5–7,5, který je následován poklesem pH (5,5–6,0) vlivem vzniku kyselých fermentačních produktů bakteriálního osídlení tlustého střeva a postupným nárůstem pH až k hodnotě 8,0<sup>6,7)</sup>. Tyto hodnoty nejsou nijak striktní a intra- i interindividuální variabilita

je značná<sup>8)</sup>. U pacientů s nespecifickými střevními zánětlivými onemocněními mohou být hodnoty pH střeva výrazně nižší<sup>9)</sup>. V oblasti LF pro terapii IBD (z ang. Inflammatory Bowel Diseases) jsou k tomuto účelu nejvíce využívány deriváty kyseliny methakrylové známé pod obchodním názvem Eudragit<sup>®</sup> (výrobce Evonik). Jedná se o nebiodegradovatelné polymery, které nejsou v těle absorbovány a jsou bez metabolizace vyloučeny. V rámci skupiny přípravků používaných pro terapii IBD v ČR jsou využívány Eudragit<sup>®</sup> L (Lightly soluble), který je rozpustný při pH > 5,5–6,0 (dle typu) a Eudragit<sup>®</sup> S (Slightly soluble) s rozpustností při pH > 7,0. Tyto polymery jsou využívány ve funkci obalu LF. pH-dependentní obal LF se po dosažení určité hodnoty pH začíná rozpouštět. Reálný počáteční čas uvolňování léčiva z LF je výrazně závislý také na tloušťce nanoseného filmu<sup>10)</sup>.

Druhým přístupem je využití zpravidla bobtnajících nebo nerozpustných, ale permeabilních polymerních látek, které vnášejí do LF tzv. časový přístup, neboli jejich použitím léková forma uvolňuje léčivo v určitém časovém intervalu. Výběr vhodného polymeru vychází z času setrvání LF v postižené části GIT. Obecně lze opět shrnout, že LF forma setrvává v závislosti na příjmu potravy v oblasti žaludku 1–5 hodin, v oblasti tenkého střeva 3–4 hodiny a v kolonu 15–72 hodin. I v tomto parametru existuje obrovská variabilita, která je ještě potvrzena zvolenou LF<sup>11)</sup>. Relativně konstantní je průchod tenkým střevem, který je srovnatelný u jednotkových i násobných LF<sup>12)</sup>. Do skupiny polymerů využívaných pro tento účel patří např. bobtnající hypromelosa či hyprolosa nebo nerozpustné polymery ethylcelulosa či zástupci skupiny Eudragit<sup>®</sup>. Do skupiny nerozpustných polymerů typu Eudragit<sup>®</sup> patří Eudragit<sup>®</sup> NE (Neutral Ester), Eudragit<sup>®</sup> RL (Retarding Lightly) a Eudragit<sup>®</sup> RS (Retarding Strongly)<sup>10)</sup>.

Posledním, novějším přístupem je využití polymerních látek, které odolávají enzymům vyšších segmentů trávicího traktu, ale přitom podléhají štěpení bakteriální mikroflórou obsaženou v kolonu<sup>13)</sup>. Vlivem mikroflóry zde dochází k jejich hydrolyze a redukci. Patří sem např. algináty, amylosa, xylan, inulin, cyklohextrin, dextransy, estery dextransu, chitosan, arabinogalaktan, guar, glukuronát, pektiny, amylopektin, polyaspartam, chondroitin sulfát, kyselina hyaluronová, kolagen atd.<sup>14)</sup>. Tyto polymery mohou vytvářet základ jak matricového systému, tak funkčního obalu LF. Vzhledem ke značné hydrofi-

Tab. 1. Rozdělení přípravků pro terapii nespecifických střevních zánětlivých onemocnění dle typu lékové formy

Typ LF	Jednotkové LF	Násobné LF
matricový	–	–
rezervoárový	Asacol <sup>®</sup> tablety Salofalk <sup>®</sup> tablety	Budenofalk <sup>®</sup> tobolky* Budenofalk <sup>®</sup> UNO granule Pentasa <sup>®</sup> tablety* Pentasa <sup>®</sup> sáček mikrogranule
kombinovaný	Cortiment <sup>®</sup> tablety	Entocort <sup>®</sup> tobolky* Salofalk <sup>®</sup> granule

\* V žaludku po rozpuštění tobolky nebo rozpadu tablety poskytují násobnou lékovou formu.

Tab. 2. Využití polymerních látek u přípravků pro terapii nespecifických střevních zánětlivých onemocnění

Přípravek	Polymer			
	pH-dependentní	nerozpustný	bio-degradovatelný	bobtnající
Asacol® tablety (400, 800 mg)	Eudragit® S	–	–	–
Asacol® 1600 mg	Eudragit® S*	–	rezistentní karboxymethyl škrob*	–
Pentasa® tablety	–	ethylcelulosa	–	–
Pentasa® sachet mikrogranule	–	ethylcelulosa	–	–
Salofalk® tablety	Eudragit® L	–	–	–
Salofalk® granule	Eudragit® L	Eudragit® NE	–	–
Budenofalk® tobolky	Eudragit® L, S	Eudragit® RL, RS	–	–
Budenofalk® UNO granule	Eudragit® L, S	Eudragit® RL, RS	–	–
Cortiment® tablety	Eudragit® L, S	–	–	hyprolosa + lipofilní složka
Entocort® tobolky	Eudragit® L	ethylcelulosa	–	–

\* Polymery jsou kombinovány v patentově chráněném obalu (Phloral®), který je spolu s akcelerační vrstvou označen obchodním názvem Opticore™.


litě<sup>15)</sup> jsou často kombinovány s pH-dependentními polymery<sup>16)</sup>. Zpravidla se uplatňují v léčivých přípravcích s cíleným přívodem do kolonu. Kombinace více přístupů představuje určitou pojistku, že léčivo bude skutečně z LF uvolněno. Pokud selže pH-dependentní přístup u pacienta s IBD, je v „záloze“ selektivní rozštěpení polymeru v tlustém střevě. Využití jednotlivých polymerních látek u přípravků pro terapii nespecifických střevních zánětlivých onemocnění dostupných na českém trhu je uvedeno v tabulce 2.

### Technologický rozbor léčivých přípravků s obsahem kyseliny 5-aminosalicylové

Následující kapitola se zabývá rozбором léčivých přípravků registrovaných v ČR pro terapii IBD s obsahem kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA), a to konkrétně přípravky Asacol®, Pentasa® a Salofalk®.

#### Přípravek Asacol® 400 mg a 800 mg, enterosolventní tableta (Tillotts Pharma GmbH)

Základní schéma uvádí obrázek 1. Přípravek funguje na principu využití pH-dependentního polymeru Eudragit® S<sup>17)</sup>. Uvolnění 5-ASA nastává okamžitě po částečném nebo celkovém rozpuštění polymerního obalu při pH > 7, které je podpořeno přítomností superdesintegrantu (látka podporující rychlý rozpad tablety) sodné soli karboxy-




Obr. 1. Přípravek Asacol® 400 a 800 mg – enterosolventní tableta

metylskrobu, který je součástí jádra<sup>18)</sup>. V případě, že pacient s IBD nevykazuje pH > 7 v lumen střeva<sup>19)</sup>, léčivo se z LF neuvolní, a pacient tedy není léčen. Vzhledem k rozpustnosti polymerního obalu je vhodnou indikací **ulcerózní kolitida s maximální lokalizací v proximální části kolonu**. Přípravek se nesmí kousat z důvodu narušení funkce obalu a užívá se vždy na lačno (tedy 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle)<sup>20)</sup>.

#### Přípravek Asacol® 1600 mg, tableta s řízeným uvolňováním léčiva (Tillotts Pharma GmbH)

Základní schéma uvádí obrázek 2. Nově registrovaný přípravek pracuje na inovativním principu kombinace pH-dependentního polymeru Eudragitu® S v kombinaci s novějším přístupem využívající štěpení obalových materiálů bakteriálními enzymy produkovanými mikroflórou kolonu<sup>21)</sup>. Jedná se o „vylepšený“, patentově chráněný obalový materiál Phloral® (dle cit.<sup>22)</sup>). Kombinace představuje pojistku v případě nedostatečné hodnoty pH v GIT u pacientů s nespecifickými střevními záněty<sup>23)</sup>. V případě, že v GIT pacienta nedojde k rozpuštění Eudragitu® S, uvolnění 5-ASA nastane v kolonu díky degradaci polysacharidu, který je součástí vnějšího obalu. Mimo to vnitřní vrstva obalu je tvořena tzv. neutralizovaným Eudragitem® S (pH upraveno na hodnotu 8,0 pufrujícím činidlem KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>), čímž se urychluje jeho rozpouštění<sup>24)</sup>. Izolační vrstva mezi jádrem tablety a obalovými vrstvami je tvořena HPMC.



Obr. 2. Přípravek Asacol® 1600 mg – tableta s řízeným uvolňováním léčiva


Výhodou přípravku je, že v oblasti kolonu by měla být dostupná celá dávka podaného léčiva v akcelerovaném režimu<sup>25</sup>). Celá technologie se označuje obchodním názvem Opticore™ (**OPTImized COlonic RElease**). Vzhledem ke konstrukci LF je jednoznačně vhodnou indikací **ulcerózní kolitida**. Přípravek se nesmí kousat z důvodu narušení funkce obalu. Tablety se mohou užívat s jídlem i bez něj, což také představuje určitou výhodu<sup>26</sup>).

#### **Přípravek Pentasa® Prolong 500 mg a 1 g, tableta s prodlouženým uvolňováním (Ferring GmbH)**


Základní schéma uvádí obrázek 3. Tableta je připravena slisováním obalených pelet (sférické částice malých rozměrů) s obsahem 5-ASA. Ta se v žaludku ihned rozpadá na jednotlivé mikropelety (limit pro rozpad tablet je dle Českého lékopisu 2017 15 min). Uvolňování léčiva začíná již v žaludku a přetrvává jak v oblasti tenkého střeva, tak kolonu. Je řízeno nerozpustným obalem z ethylcelulosy<sup>27</sup>), ale také rozpustností účinné látky, která je závislá na hodnotě pH ve střevním lumen a roste s rostoucím pH<sup>28</sup>). Zatímco rozpustnost 5-ASA je při pH 6,0 1,2 mg/ml, při pH 7,2 je 5,5 mg/ml<sup>29</sup>). Je třeba zmínit, že přibližně 60 % 5-ASA je uvolněno v oblasti tenkého střeva, zbývajících 40 % pak v oblasti kolonu<sup>30</sup>). Vzhledem k profilu uvolňování 5-ASA a z něj vyplývající koncentrace léčiva v jednotlivých segmentech GIT je přípravek vhodný zejména k léčbě **Crohnovy choroby**. Dle SPC přípravku by se tablety měly polykat nerozkousané, aby nedošlo k poškození řídicího obalu a nejlépe před jídlem, čímž se zamezí většímu uvolnění léčiva v nepostižených částech střeva. Přípravek Pentasa® Prolong se podává nezávisle na jídle v dávce 2–4 g jednotlivě nebo v rozdělených dávkách a nesmí se kousat. Pro usnadnění polknutí se mohou tablety rozptýlit v 50 ml studené vody, zamíchat a ihned vypít<sup>31</sup>).

#### **Přípravek Pentasa® sachet 2 g a 4 g, granule s prodlouženým uvolňováním (Ferring GmbH)**

Základní schéma uvádí obrázek 4. Přípravek je tvořen obalenými mikrogranulemi (částice malých rozměrů, u kterých není kladen takový důraz na



Obr. 3. Přípravek Pentasa® Prolong – tableta s prodlouženým uvolňováním léčiva



Obr. 4. Přípravek Pentasa® sachet – mikrogranule s prodlouženým uvolňováním léčiva


sférický tvar jako u pelet) s obsahem 5-ASA obalenými ethylcelulosovým filmem. Princip uvolňování 5-ASA je srovnatelný s přípravkem Pentasa® Prolong, u kterého dochází k velmi krátkému času zpoždění kvůli rozpadu tablety. Výhodu přípravku lze vidět pouze v aplikační formě u pacientů s potížemi při polykání tablet, kteří zpravidla pro dosažení potřebné dávky polykají více tablet najednou.

#### **Přípravek Salofalk® 500 mg, enterosolventní tablety (Dr. Falk Pharma GmbH)**


Základní schéma uvádí obrázek 5. Tablety jsou potaženy třemi vrstvami enterosolventního polymeru Eudragit® L, který odolává pH žaludku. Následně se tento obal rozpouští při dosažení pH 6,0. Vrstva HPMC pod vnějším obalem nemodifikuje uvolňování léčiva. Léčivo se začíná uvolňovat cca po 15 minutách v tenkém střevě. Celé množství léčiva se uvolní přibližně za 60 minut<sup>32,33</sup>). Přípravek je vhodný u **Crohnovy choroby postihující větší úsek tenkého střeva a vzestupný tračník**. Tablety se užívají nerozkousané a rozděleně ve třech dílčích dávkách, vždy na lačno (pozn. tedy 1 hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle)<sup>34</sup>).

#### **Přípravek Salofalk® 1500 a 3000 mg, enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním (Dr. Falk Pharma GmbH)**

Základní schéma uvádí obrázek 6. Přípravek je tvořen matricovými granulemi s obsahem 5-ASA na bázi nerozpustného polymeru Eudragit® NE potaženými vrstvou Eudragit® L 100, který odolává pH žaludku. Následně se tento obal rozpouští při dosažení pH 6,0 a dochází k prodlouženému uvolňování léčiva z matricových granulí. Dle Kruis et al. se uvolní přibližně 80 % léčiva během následujících 3 hodin<sup>35</sup>). Dle Karkossa et al., který využil nový *in vitro* prediktivní disoluční model, se léčivo uvolňuje výrazně pomaleji a 80 % se uvolní přibližně po 7 hodinách<sup>36</sup>). Uvádí také velký vliv interindividuální variability na průběh uvolňování. Dle SPC přípravku se granule nemají rozkousávat, aby nedošlo k poškození polymerního obalu. Neuvádí však nic o vazbě na příjem stravy<sup>37</sup>). Tak



Obr. 5. Přípravek Salofalk® – enterosolventní tableta



Obr. 6. Přípravek Salofalk® – enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním léčiva


jako jiné přípravky založené na pH-dependentním polymeru by se tyto enterosolventní granule měly podávat na lačno. Je možné je podat jednou denně nebo rozdělit do tří dílčích dávek. Ve srovnání s tabletou Salofalk® je výhodou možnost jednodávkového podání a výrazně větší povrch, který granule v oblasti střeva pokryjí. Výhodou představuje tento přípravek také pro pacienty s potížemi při polykání tablet. Vzhledem k disolučnímu profilu při použití inovativních *in vitro* disolučních metod je rozdílné také zacílení přípravku do distálnějších částí GIT. Je vhodný pro léčbu **ulcerózní kolitidy**, včetně levostranných forem zánětu. Efekt byl zaznamenán i u proktosigmoiditidy<sup>38</sup>). Dávka 5-ASA dostupná v oblasti kolonu je vyšší než v případě přípravku Pentasa®.

### Technologický rozbor léčivých přípravků s obsahem budesonidu


Součástí této kapitoly je rozbor léčivých přípravků registrovaných v ČR pro terapii IBD s obsahem budesonidu. Jedná se o přípravky Budenofalk®, Cortiment® a Entocort®.

#### Přípravek Budenofalk® 3 mg, enterosolventní tvrdá tobolka (Dr. Falk Pharma GmbH)

Základní schéma uvádí obrázek 7. Uvolňování léčiva není řízeno tobolkou (rozpustí se v žaludku cca za 10 min), ale dvojité obalenými peletami uvnitř tobolky. Vnitřní obal je tvořen směsí pH-dependentních polymerů Eudragit® L i S a nerozpustného polymeru Eudragit® RS s nízkou permeabilitou. Základem vnějšího obalu je nerozpustný, ale poměrně permeabilní polymer Eudragit® RL<sup>39</sup>). Obal granulí se začíná rozpouštět dle informací výrobce při  $\text{pH} > 6,4^{40-42}$ ). Nicméně přítomnost nerozpustných polymerů způsobuje, že rozpouštění obalů je poměrně pomalé. Dle Goyanese et al. začíná ve střední oblasti jejunu a během 120 minut se uvolní přibližně 80 % léčiva, přičemž v prvních 60 minutách pouze



Obr. 7. Přípravek Budenofalk® – enterosolventní tvrdá tobolka s obsahem obalených pelet



Obr. 8. Přípravek Budenofalk® UNO – enterosolventní granule


30 % léčiva<sup>43</sup>) (tedy více distálně ve srovnání s přípravkem Entocort® – viz dále). Přípravek je vhodný zejména pro terapii **Crohnovy choroby postihující ileum a/nebo vzestupný tračník**. Nově schválenou indikací je mikroskopická kolitida. Tobolky (zpravidla tři v jedné dávce) se užívají půl hodiny před jídlem a polykají se s dostatečným množstvím tekutiny<sup>44</sup>).

#### Přípravek Budenofalk® UNO 9 mg, enterosolventní granule (Dr. Falk Pharma GmbH)


Základní schéma uvádí obrázek 8. Princip uvolňování budesonidu je po velmi krátkém čase zpoždění (cca 10 min) srovnatelný s přípravkem Budenofalk® enterosolventní tobolky. Výhodou přípravku lze vidět pouze v aplikační formě u pacientů s potížemi při polykání, kteří zpravidla pro dosažení potřebné dávky polykají více tobolek. Dle SPC se obsah sáčku užívá 30 minut před snídaní. Granule se vkládají na jazyk a polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny (např. se sklenicí vody). Granule se nežvýkají ani nedrtí z důvodu porušení funkčního obalu<sup>45</sup>).

#### Přípravek Cortiment® 9 mg, tableta s prodlouženým uvolňováním (Ferring GmbH)

Základní schéma uvádí obrázek 9. Jedná se o obalenou tabletu. Použitý obalový materiál je tvořen směsí pH-dependentních polymerů Eudragit® L a S. Jádro tablety je tvořeno lipofilními granulemi na bázi kyseliny stearové a amfifilního lecitinu s obsahem léčiva, které jsou rovnoměrně rozptýleny v bobtnajícím polymeru hyprolose (hydroxypropylcelulosa – HPC). Jádro má matricovou povahu. Tento typ hydrofilně/lipofilní tablety potažené gastrorezistentním obalem se označuje jako tzv. MMX technologie (z ang. Multi-Matrix Technology)<sup>46, 47</sup>). Obal tablety se dle informací z literatury rozpouští při  $\text{pH} > 7^{48}$ ). Dle složení obalu a přítomnosti Eudragit® L lze usuzovat, že reálně bude tato hodnota pH pravděpodobně nižší. Následně vzniká z bobtnajících



Obr. 9. Přípravek Cortiment® – tableta s prodlouženým uvolňováním



Obr. 10. Přípravek Entocort® – tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním léčiva s obsahem obalených granulí

ho polymeru gelová vrstva, která moduluje uvolňování léčiva a tlumí rychlé uvolnění léčiva z granulí. Z tohoto důvodu je uvolňování léčiva z přípravku postupné a relativně rovnoměrné (blízké kinetice tzv. nultého řádu)<sup>49</sup>. Přípravek je vhodný pro léčbu **ulcerózní kolitidy**. Prokazuje účinnost i u jednostranných forem zánětů. Dle SPC se přípravek podává v dávce jedna tableta ráno s jídlem nebo nalačno<sup>50</sup>. S jídlem však dochází ke snížení  $C_{\max}$  a prodloužení  $T_{\max}$ <sup>51</sup>. Tableta se zapije sklenicí vody a nesmí se lámat, drtit nebo žvýkat, protože by mohlo dojít k porušení prodlouženého uvolňování léčiva.

#### **Přípravek Entocort® 3 mg, tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním (Tillotts Pharma GmbH)**

Základní schéma uvádí obrázek 10. Přípravek je tvořen obalenými granulami umístěnými do tvrdé želatinové tobolky. Uvolňování léčiva není tedy opět řízeno tobolkou (rozpustí se v žaludku cca za 10 min)<sup>52</sup>, ale funkčním obalem granulí. Léčivo je součástí potahu spolu s nerozpustným hydrofobním polymerem ethylcelulosou, který je nanesen nástřikem na sacharosové indiferentní jádro. Vnější obal je tvořen pH-dependentním polymerem Eudragit® L. Léčivo se uvolňuje po rozpuštění pH-dependentního obalu granulí při pH > 5,5 (strukturně odlišný od typu s rozpustností při pH > 6,0)<sup>53</sup>. Následuje prodloužené uvolňování léčiva z ethylcelulosové matrice, které začíná v duodenu kinetikou 1. řádu, je tedy z počátku uvolňováno výrazně rychleji a následně se zpomaluje, čímž se odlišuje od přípravku Budenofalk®. Během prvních 60 minut se uvolní více než 55 % léčiva, 80 % léčiva se pak uvolní za více než 120 minut. Z disolučního chování přípravku lze vyvodit rovnoměrnější a mírně větší pokrytí oblasti tenkého střeva<sup>43</sup>. Nicméně existuje disoluční model srovnávající Entocort® a Cortiment®, kde se již během 60 minut uvolní přibližně 80 % léčiva<sup>49</sup>.

Z disolučního chování přípravku vyplývá, že přípravek je vhodný pro terapii **Crohnovy choroby postihující ileum a/nebo vzestupný tračník**. Nově schválenou indikací je mikroskopická kolitida. Tobolky by se měly polykat nalačno<sup>54</sup>.

#### **Praktická doporučení z pohledu farmaceutické technologie**

Z hlediska uvedených informací lze definovat základní doporučení a praktické informace a shrnout je do základních bodů:

I. Žádná z uvedených lékových forem se nesmí drtit ani kousat, jelikož by došlo k poškození obalu/ů, a tak k poškození konceptu LF.

II. Přípravky ve formě tobolek (konkrétně Entocort®, Budenofalk®) obsahují obalenou násobnou lékovou formu ve formě obalených granulí nebo pelet, která zajišťuje danou formu řízeného uvolňování. Želatinová tobolka představuje pouze nosič, který definuje dávku a usnadňuje aplikaci. Teoreticky je možné obsah tobolky vysypat a spolknout s dostatečným množstvím tekutiny (viz Budenofalk® UNO).

III. Pentasa® Prolong a Pentasa® sachet: ve smyslu technologie uvolňování se jedná o identické principy a není mezi nimi žádný významný rozdíl.

IV. Naopak Salofalk® tablety a Salofalk® granule vykazují odlišný profil uvolňování léčiva. Přestože oba přípravky začínají uvolňovat 5-ASA při pH > 6, Salofalk® ve formě granulí uvolňuje léčivo výrazně pomaleji ve srovnání s tabletami.

V. Přípravek Asacol® 1600 mg představuje kombinaci pH-dependentního polymeru a biodegradabilního polymeru, který zajišťuje uvolňování 5-ASA i v případě nedostatečné hodnoty pH v GIT u pacientů s IBD, kdy mohou selhávat přípravky založené pouze na pH-dependentních polymerech. Výhodou přípravku je jednorázová dostupnost celé dávky léčiva v oblasti kolonu.

VI. Z pohledu farmaceutické technologie lze rozdělit přípravky z hlediska preference pro jednotlivé typy IBD – Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (tab. 3).

VII. V některých zemích jsou dostupné přípravky (Mezavant®, Lialda®) s obsahem 5-ASA v dávce 1,2 g ve formě MMX (technologie viz Cortiment®). Uvolňování je závislé na pH (pH > 6,8), jako je tomu u jiných pH-dependentních přípravků.

VIII. Při výběru vhodného přípravku je důležité zohlednit preference pacienta a podpořit tím jeho compliance. Dle Mackenzie-Smith et al. pacienti s ulcerózní kolitidou obecně preferují spíše tablety (67 %) než granulát (29 %). Dle vnímání gastroenterologů preferují pacienti tablety (49 %) před granulát (38 %), 13 % pacientů preferenci nemá<sup>55</sup>. Až 70 % pacientů preferuje dávkování v jedné denní dávce<sup>56</sup>. Nízká adherence pacienta může vést k vyššímu riziku relapsu onemocnění (dle studie Kane et al. až 5krát vyšší riziko pro ulcerózní kolitidu)<sup>57</sup>. Současně je třeba brát v potaz i objem účinné látky, jelikož se 5-ASA podává v dávce až 4,8 g. Pacient tedy každodenně užívá vyšší počet tablet nebo polyká velký objem nerozpustného granulátu.

#### **Závěr**

Jak je patrné, skupina těchto přípravků je velmi rozmanitá. Zahrnuje různé lékové formy, různé technologie a různé pomocné látky. Tyto parametry se pak v kombinaci odrážejí v chování přípravku v lidském organismu. Je důležité připomenout, že vedle konstituce lékové formy se na výsledném účinku podílí další faktory, jako je compliance pacienta (souvisí s dávkovacím režimem a množstvím podané léčivé látky v dané lékové formě), rozsah a aktivita onemocnění, individuální podmínky GIT atd. Snahou tohoto příspěvku bylo pokusit se o rekonstrukci lékových forem z hlediska znalostí farmaceutické technologie a dostupných informací v dané oblasti a nastínit hlavní parametry pro rozhodování při výběru vhodného léčivého přípravku pro určitý typ a lokalizaci nespecifického střevního zánětlivého onemocnění.

**Střet zájmů:** žádný.

Tab. 3. Přípravky z hlediska preference z pohledu farmaceutické technologie

	5-ASA		Budesonid	
	Crohnova choroba (CD)			
1	Pentasa® sachets Pentasa® tablety	Uvolňují LČ* již v žaludku (nejdříve ze všech přípravků), pokrytí celého tenkého střeva.	Entocort® tobolky	Obal se rozpouští při pH > 5,5, následně se uvolní 55 % budesonidu během 60 min a 80 % během více než 120 min
2	Salofalk® tablety	Obal se rozpouští při pH > 6, celé množství LČ se uvolní již během 60 min.	Budenofalk® tobolky Budenofalk® granule	Obal se rozpouští při pH > 6,4, následně se uvolní pouze 30 % budesonidu během 60 min a 80 % během 120 min
3	Asacol® 400 a 800 mg	Obal se rozpouští při pH > 7, LČ se uvolňuje okamžitě – nemusí pokrývat postižené oblasti CD v tenkém střevě.	–	–
Ulcerózní kolitida (UC)				
1	Asacol® 1600 mg	Akcelerovaně uvolňuje 5-ASA i v případě nízké hodnoty pH v distálním ileu a kolonu, jednorázová vysoká dávka.	Cortiment® tablety	Obal se rozpouští při pH > 7,0** (ileum), následně se budesonid uvolňuje prodlouženě kinetikou 0. řádu.
2	Salofalk® granule	Obal se rozpouští při pH > 6, LČ se uvolňuje prodlouženě (až 7 hod.), což posouvá distribuci léčiva více k distálnějším formám UC.	–	–
3	Asacol® 400 a 800 mg	Uvolňuje 5-ASA při pH > 7, LČ se uvolňuje okamžitě, u pacientů s nízkým lumenálním pH nemusí být dostatečně efektivní.	–	–
4	Salofalk® tablety	Obal se rozpouští při pH > 6, LČ se uvolní během 60 min, pro terapii distálnějších forem UC jsou vhodnější výše uvedené přípravky.	–	–
5	Pentasa® sachets Pentasa® tablety	Uvolňují LČ již v žaludku, většina LČ se uvolní v oblasti tenkého střeva, pro terapii distálnějších forem UC jsou vhodnější výše uvedené přípravky.	–	–

\* léčivo

\*\* spíše nižší pH než 7 z hlediska složení obalu

## Literatura

- Ludwig A., van Ooteghem M., Delva A. Disintegration of hard gelatin capsules, part 1: Composition and structure of the capsule wall. *Pharm. Ind.* 1979; 41, 796–798.
- Dvořáčková K. Principy uvolňování léčiv z perorálních matricových tablet obsahujících hypromelosu. *Chem. Listy* 2009; 103(1), 66–72.
- Colombo P., Bettini B., Santi P., Peppas N. A. Swellable matrices for controlled drug delivery: gel-layer behaviour, mechanisms and optimal performance. *Pharm. Sci. Tech. Today* 2000; 3(6), 198–204.
- Bruschi M. L. Strategies to modify the drug release from pharmaceutical systems. 1. vydání. Cambridge: Woodhead Publishing 2015.
- Philip A. K., Philip B. Colon targeted drug delivery systems: a review on primary and novel approaches. *Oman Med. J.* 2010; 25(2), 79–87.
- Shimono N., Takatori T., Ueda M., Mori M., Higashi Y., Nakamura Y. Chitosan dispersed system for colon-specific drug delivery. *Int. J. Pharm.* 2002; 245(1–2), 45–54.
- Singh B. N. Modified-release solid formulations for colonic delivery. *Recent. Pat. Drug Deliv. Formul.* 2007; 1, 53–63.
- Segregur D., Flanagan T., Mann J., Moir A., Karlsson E. M., Hoch M., Carlile D., Sayah-Jeanne S., Dressman J. Impact of acid-reducing agents on gastrointestinal physiology and design of biorelevant dissolution tests to reflect these changes. *J. Pharm. Sci.* 2019; 108(11), 3461–3477.
- Nugent S. G. Intestinal luminal pH in inflammatory bowel disease: possible determinants and implications for therapy with aminosalicylates and other drugs. *Gut* 2020; 48(4), 571–577.
- Naiserová M., Kubová K., Vysloužil J., Bernatoniene J., Brokalakis I., Vetchý D. (Meth)acrylates copolymers of Eudragit® type in oral tablet technology. *Čes. slov. Farm.* 2019; 68, 183–197.
- Maurer J. M., Schellekens R. C., van Rieck H. M., Wanke C., Jordanov V., Stellaard F., Wutzke K. D., Dijkstra G., van der

- Zee M., Woerdenbag H., Frijlink H. W., Kosterink J. G. Gastrointestinal pH and transit time profiling in healthy volunteers using the intellicap system confirms ileo-colonic release of copolymer tablets. *PLoS One* 2015; 10(7): e0129076. <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0129076> (12. 8. 2019)
12. Sinha V. R., Kumria R. Microbially triggered drug delivery to the colon. *Eur. J. Pharm. Sci.* 2003; 18(1), 3–18.
  13. Park K., Shalaby W. S., Park H. (eds.) Biodegradation. In: Biodegradable hydrogels for drug delivery, USA: Technomic publishing company 1993; 13–34.
  14. Rajpurohit H., Sharma P., Sharma S., Bhandari A. Polymers for colon targeted drug delivery. *Indian J. Pharm. Sci.* 2010; 72(6), 689–696.
  15. Freire C., Podczeczek F., Veiga F., Sousa J. Starch-based coatings for colon-specific delivery. Part II: Physicochemical properties and in vitro drug release from high amylose maize starch films. *Eur. J. Pharm. Biopharm.* 2009; 72(3), 587–594.
  16. Mohanty, S., Panigrahi A. K. Multiparticulate drug delivery system for colon targeting. *Int. J. Pharm. Pharm. Sci.* 2015; 7(3), 433–436.
  17. Thakral S. N., Thakral N. K., Majumdar D. K. Eudragit®: a technology evaluation. *Expert Opin. Drug Del.* 2012; 10(1), 131–149.
  18. Madu S. J., Azubuikwe C. P., Okubanjo O., Mohammed A., Emeje O. M. Physicochemical and disintegrant properties of sodium carboxymethyl starch derived from *Borassus aethiopicum* (Arecaceae) shoot. *J. Polym. Res.* 2018; 5(8), 167.
  19. Ibekwe, V. C., Liu F., Fadda H. M., Khela M. K., Evans D. F., Parsons G. E., Basit A. W. An investigation into the in vivo performance variability of pH responsive polymers for ileo-colonic drug delivery using gamma scintigraphy in humans. *J. Pharm. Sci.* 2006; 95(12), 2760–2766.
  20. SPC Asacol 400, 800 enterosolventní tablety. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0203805&tab=texts> (12. 8. 2019).
  21. Kaur G., Jain S., Tiwary A. Recent approaches for colon drug delivery. *Recent. Pat. Drug Deliv. Formul.* 2007; 1(3), 222–229.
  22. Oral drug delivery technologies. Phloral®. <https://healthcare.evonik.com/product/health-care/downloads/evonik-phloral-dual-action-coating-fail-safe-colonic-delivery-factsheet.pdf> (12. 10. 2019).
  23. McConnell E. L., Fadda H. M., Basit A. W. Gut instincts: Explorations in intestinal physiology and drug delivery. *Int. J. Pharm.* 2008; 364(2), 213–226.
  24. Liu F., Moreno P., Basit A. W. A novel double-coating approach for improved pH-triggered delivery to the ileo-colonic region of the gastrointestinal tract. *Eur. J. Pharm. Biopharm.* 2010; 74(2), 311–315.
  25. Varum F., Freire A. C., Bravo R., Buser T., Goutte F., Basit A. W. Opticore: Accelerating drug release in ileo-colonic region of the gastrointestinal tract. Denver: AAPS conference 13.–17. 11. 2016. *Poster presentation*.
  26. SPC Asacol 1600 mg tablety s řízeným uvolňováním. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0242525&tab=texts> (1. 10. 2019).
  27. Karoui S. (ed.) Inflammatory bowel disease – Advances in pathogenesis and management. 1. ed. Rijeka: IntechOpen 2012.
  28. Richard J., Benoît J. P. *Techniques de l'Ingénieur* 2000; 2210, 1–20.
  29. Tenjarla S. Dissolution of commercially available mesalamine formulations at various pH levels. *Drugs R D.* 2015; 15(2), 211–215.
  30. Chuong M. C., Christensen J. M., Ayres J. W. New dissolution method for mesalamine tablets and capsules. *Dissolution Technologies* 2008; 15(3), 7–14. [http://www.dissolutiontech.com/DTreasure/200808Articles/DT200808\\_A01.pdf](http://www.dissolutiontech.com/DTreasure/200808Articles/DT200808_A01.pdf) (11. 4. 2020).
  31. SPC Pentasa 500 mg Prolong tablety s prodlouženým uvolňováním. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0247411&tab=texts> (12. 3. 2020).
  32. Gisbert J. P., Gomollon F., Mate J., Pajares J. M. Role of 5-aminosalicylic acid (5-ASA) in treatment of inflammatory bowel disease: a systematic review. *Dig. Dis. Sci.* 2002; 47, 471–488.
  33. Wilhelm R., Pröls M., Greinwald R., Nacac T. Optimised high-dose mesalazine-containing tablet. WO2017072050A1. <https://patents.google.com/patent/WO2017072050A1/en> (30. 10. 2019).
  34. SPC Salofalk 500 enterosolventní tablety. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0075567> (9. 9. 2019).
  35. Kruijs W., Greinwald R., Fingerhut T. In-vitro dissolution testing of 5-aminosalicylic acid release from pH dependent mesalazine formulations. *J. Crohns Colitis* 2011; 5(5), 499–500.
  36. Karkossa F., Klein F. A biopredictive in vitro comparison of oral locally acting mesalazine formulations by a novel dissolution model for assessing intraluminal drug release in individual subjects. *J. Pharm. Sci.* 2018; 107(6), 1680–1689.
  37. SPC Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0195909&tab=texts> (23. 10. 2019).
  38. Leifeld L., Pfützer R., Morgenstern J., Gibson P. R., Makhouski Y., Greinwald R., Mueller R., Kruijs W. Mesalazine granules are superior to Eudragit-L-coated mesalazine tablets for induction of remission in distal ulcerative colitis – a pooled analysis. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2011; 34, 1115–1122.
  39. Gruber P., Lach H. J., Otterbeck N. Budesonide pellets with a controlled release pattern and process for producing them. WO1995008323A1. <https://patents.google.com/patent/WO1995008323A1/en> (15. 11. 2019).
  40. Villa R., Pedrani M., Ajani M., Fossati L. Controlled release and taste masking oral pharmaceutical composition. US 8293273 B2. <https://patents.google.com/patent/US9592203B2/en> (3. 12. 2019).
  41. Iborra M., Alvarez-Sotomayor D., Nos P. Long-term safety and efficacy of budesonide in the treatment of ulcerative colitis. *Clin. Exp. Gastroenterol.* 2014; 7, 39–46.
  42. Klein S., Stein J., Dressman J. Site-specific delivery of anti-inflammatory drugs in the gastrointestinal tract: an in-vitro release model. *J. Pharm. Pharmacol.* 2005; 57(6), 709–719.
  43. Goyanes A., Hatton G. B., Basit A. W. A dynamic in vitro model to evaluate the intestinal release behaviour of modified-release corticosteroid products. *J. Drug Deliv. Sci. Tec.* 2015; 25, 36–42.
  44. SPC Budenofalk 3 mg enterosolventní tvrdé tobolky. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0064787> (18. 11. 2019).
  45. SPC Budenofalk UNO 9 mg enterosolventní granule. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0158943&tab=texts> (12. 8. 2019).
  46. Nardelli S., Pisani L. F., Tontini G. E., Vecchi M. L. MMX® technology and its applications in gastrointestinal diseases. *Therap. Adv. Gastroenterol.* 2017; 10(7), 545–552.
  47. Hillery A. M., Brayden D. J. Oral drug delivery. In: Hillery A. M., Park K. (eds.) *Drug Delivery: Fundamentals & Applications*, 2<sup>nd</sup> ed. London: Taylor & Francis Group, LLC 2017; 171–200.
  48. Thakral S., Thakral N. K., Majumdar D. K. Eudragit®: a technology evaluation. *Expert Opin. Drug Deliv.* 2012; 10(1), 131–149.



49. **Goyanes A., Chang H., Sedough D., Hatton G. B., Wang J., Buanz A., Gaisford S. Basit A. W.** Fabrication of controlled-release budesonide tablets via desktop (FDM) 3D printing. *Int. J. Pharm.* 2015; 496(2), 414–420.
50. Cortiment 9 mg tableta s prodlouženým uvolňováním. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0206462&tab=texts> (25. 10. 2019).
51. **Brunner M., Ziegler S., di Stefano A. F. D., Deghanyar P., Kletter K., Tschurlovits M., Villa R., Bozzella R., Celasco G., Moro L., Rusca A., Dudczak R., Müller M.** Gastrointestinal transit, release and plasma pharmacokinetics of a new oral budesonide formulation. *Br. J. Clin. Pharmacol.* 2006; 61(1), 31–38.
52. **Stegemann S.** Hard gelatin capsules today – and tomorrow. <https://pdfs.semanticscholar.org/12d4/148f4e7a261c0d-3020c0140f7192ea361706.pdf> (20. 11. 2019).
53. Eudragit®. [https://healthcare.evonik.com/sites/lists/NC/Documents/HC/Evonik-Eudragit\\_brochure.pdf](https://healthcare.evonik.com/sites/lists/NC/Documents/HC/Evonik-Eudragit_brochure.pdf) (11. 10. 2019).
54. SPC Entocort 3 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0208797&tab=texts> (30. 9. 2019).
55. **Mackenzie-Smith L., Marchi P., Thorne H., Timeus S., Young R., le Calvé P.** Patient preference and physician perceptions of patient preference for oral pharmaceutical formulations: results from a real-life survey. *Inflamm. Bowel Dis.* 2018; 3(1), 43–51.
56. **Keil R., Wasserbauer M., Zádorová Z., Kojecký V., Hlava Š., Šťoviček J., Chudý J., Roznětinská M., Drábek J., Kubišová N., Lochmannová J.** Adherence, risk factors of non-adherence and patient's preferred treatment strategy of mesalazine in ulcerative colitis: multicentric observational study. *Scand. J. Gastroenterol.* 2018; 53(4), 459–465.
57. **Kane S., Huo D., Aikens J., Hanauer S.** Medication nonadherence and the outcomes of patients with quiescent ulcerative colitis. *Am. J. Med.* 2003; 114(1), 39–43.