

PŮVODNÍ PRÁCE

Možnost ovlivnění duševního zdraví u pacientů s farmakorezistentní schizofrenií – augmentace klozapinu dlouhodobě působícími parenterálními antipsychotiky: série případů

Potential impact on mental health in patients with treatment-resistant schizophrenia – clozapine augmentation with long-acting parenteral antipsychotics: a case series

Martina Nováková • Tomáš Hammer • Eliška Nováková • Michaela Mayerová • Libor Ustohal • Hana Kotolová

Došlo 14. srpna 2023 / Přijato 16. října 2023

Souhrn

Úvod: Míra farmakorezistence se u pacientů s diagnózou schizofrenie pohybuje okolo 30 %. U těchto pacientů je léčivem volby klozapin, ovšem ne vždy dochází k adekvátní odpovědi na léčbu. Jedním z možných augmentačních přístupů specificky u nonadherentních pacientů je aplikace dlouhodobě působících parenterálních antipsychotik. Naším cílem bylo zhodnotit dosavadní zkušenosti z podání kombinace atypického antipsychotika klozapinu a dlouhodobě působících injekčních antipsychotik farmakorezistentním pacientům na Psychiatrické klinice FN Brno v České republice a zhodnotit bezpečnost a účinnost takového podání.

Metody: Byla provedena retrospektivní evaluace kazistik pacientů, kteří byli v letech 2016–2020 hospitalizováni na Oddělení pro terapii psychotických poruch a měli v lékové anamnéze kombinaci klozapinu a depotního antipsychotika.

Výsledky: U více než u poloviny pacientů nedošlo během sledovaného období k relapsu onemocnění. Klinická manifestace nežádoucích účinků kombinační léčby

se jeví na našem vzorku pacientů nízká, manifestovaly se především mírné a farmakologicky řešitelné nežádoucí účinky (tachykardie). Pouze u jedné z kazuistik byla zaznamenána neutropenie, která vyústila k vysazení klozapinu a pacientovi byla ponechána medikace dlouhodobě působícího injekčního antipsychotika.

Závěr: Z našeho zjištění vyplývá, že augmentace klozapinu depotními antipsychotiky je možnou terapeutickou intervencí, ze které by mohli mít farmakorezistentní pacienti vysoký profit. Nicméně je nutné zdůraznit, že tento terapeutický přístup by měl být podán pouze po důkladném zvážení dosavadní terapie, a tedy striktně individualizovaný, vázaný na dostatečnou odbornou zkušenost ošetřujícího lékaře, popř. klinického farmaceuta.

Klíčová slova: schizofrenie • klozapin • dlouhodobě působící antipsychotika • farmakorezistence • non-adherence

Summary

Introduction: The rate of pharmacoresistance among in patients diagnosed with schizophrenia is around 30%. Clozapine is the drug of choice for these patients; however, an adequate response to treatment doesn't always occur. One of the possible augmentation approaches, specifically for non-adherent patients, is the administration of long-acting parenteral antipsychotics. Our goal was to evaluate previous experiences of administering a combination of the atypical antipsychotic clozapine and long-acting injectable antipsychotics to pharmacoresistant patients at the Department of Psychiatry the Czech Republic and to assess the safety and effectiveness of such administration.

M. Nováková^{1,2*} • T. Hammer^{1,3*} • E. Nováková¹ • M. Mayerová⁴ • L. Ustohal^{1,4} • PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.¹ (✉)

¹Ústav farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno

e-mail: kotolovah@pharm.muni.cz

²Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

³Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

⁴Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno

* hlavní autoři

Methods: A retrospective evaluation of patient case studies was conducted for those who were hospitalized in the Ward for the therapy of Psychotic disorders between 2016 and 2020 and had a medication history of combining clozapine and depot antipsychotics.

Results: Over half of the patients had no illness relapses during the observed period. The clinical manifestation of adverse effects from combination therapy appears low in our patient sample, primarily involving mild and pharmacologically manageable side effects (tachycardia). Only one of the cases recorded neutropenia, which led to discontinuation of clozapine; the patient was maintained on long-acting injectable antipsychotics medication.

Conclusion: From our findings, it can be inferred that augmenting clozapine with depot antipsychotics is a potential therapeutic intervention that pharmacoresistant patients could benefit from. However, it is essential to emphasize that this therapeutic approach should only be administered after carefully considering the patient's existing treatment. It should be strictly individualized based on the treating physician's or clinical pharmacist's sufficient professional experience.

Key words: schizophrenia • clozapine • long-acting antipsychotics • pharmacoresistance • nonadherence

Úvod

Schizofrenie náleží mezi závažná devastující chronická duševní onemocnění významně narušující kvalitu života pacientů. Ovlivňuje nejen osobní a rodinný, ale i pracovní život, a zasahuje také do oblasti mezilidských vztahů. Prevalence se podle dostupných dat pohybuje okolo 0,5 %^{1, 2}.

Pro terapii schizofrenie je stěžejní nastavení medikace léčivý ze skupiny antipsychotik, jejichž společným mechanismem účinku je blokování rodiny D2 postsynaptických dopaminových receptorů. Tyto léky redukuje zejména pozitivní příznaky, do určité míry i negativní příznaky onemocnění a zlepšují sociální fungování pacientů³. Terapeutický účinek antipsychotik je často nedostatečný a u přibližně 30 % pacientů se objevuje schizofrenie rezistentní na léčbu/treatment-resistant schizophrenia (TRS). O TRS hovoříme v případě, kdy dochází k nepřiměřené odpovědi na \geq dva různé neklozapinové antipsychotické léky jak z 1., tak 2. generace antipsychotik, každé užívané v přiměřené dávce a délce trvání, přičemž je známo, že byl pacient k terapii adherentní⁴.

I přes úvahy o jiných možnostech terapie TRS a nutnosti individualizace léčebných strategií, je za léčivo volby stále považován klozapin^{5, 6}. Klozapin byl zařazen do terapie v sedmdesátých letech 20. století jako atypické antipsychotikum 2. generace, které vykazovalo oproti antipsychotikům 1. generace nižší tendenci k extrapyramidovým nežádoucím účinkům⁷. Léčivo ale bylo

od poloviny sedmdesátých let stahováno z některých evropských trhů kvůli výskytu závažného nežádoucího účinku – agranulocytózy, který byl hlášen ve Finsku v roce 1975⁸. Nedůvěra v klozapin byla zvrácena přelomovou studií Kanea z roku 1988, ve které klozapin přinesl zlepšení u přibližně 30 % pacientů, kteří splnili přísná kritéria pro rezistenci na léčbu. Studie prokázala superioritu klozapinu v parametru účinnosti oproti chlorpromazinu⁹. Tento milník vedl v devadesátých letech 20. století k znovuuvedení klozapinu na většinu světového trhu a k jeho návratu k terapii konkrétně TRS^{7, 10}.

Vyšší účinnost klozapinu u TRS oproti jiným antipsychotikům 1. a 2. generace byla opakovaně potvrzena, navíc o jeho významu hovoří i skutečnost, že je zařazen v seznamu WHO Model List of Essential Medicines^{9, 11, 12}. Klozapin je spojován také s dalšími benefičními vlastnostmi, jako je náladu stabilizující efekt, snížení rizika sebevražedných pokusů, u pacientů také dochází ke zlepšení kognitivních funkcí¹³. Vykazuje nízkou tendenci k extrapyramidovým nežádoucím účinkům, a proto ho lze využít u pacientů s Parkinsonovou chorobou s manifestovanou psychózou. Využívá se i jeho efektu při léčbě klidového a posturálního třesu u této diagnózy^{14–16}.

Terapie klozapinem je specificky indikována pro pacienty s TRS¹⁷, přičemž je provázena nutností pravidelně sledovat hematologické parametry z důvodu rizika krevní dyskrázie, sledují se také plazmatické koncentrace klozapinu pro nastavení optimální terapeutické dávky. Riziko neutropenie/agranulocytózy je při užívání klozapinu vyčísleno na 3,8 % (závažné u 0,9 % pacientů; mortalita se objevuje u 0,01 % pacientů) a vyskytuje se většinou v prvních 3 měsících léčby^{1, 18, 19}.

Klozapin i přes svou schopnost postihnout více receptorových systémů (vykazuje vazebnou afinitu k dopaminergním, serotoninergním, cholinergním, adrenergním a histaminergním receptorům)^{20, 21}, není v rámci monoterapie TRS u 40–70 % pacientů dostatečně efektivní^{22–24}. Jedná se o pacienty se **schizofrenií rezistentní ke klozapinu/clozapine-resistant schizophrenia (CRS)**, kteří náleží vůbec k nejtěžším pacientům se schizofrenií. Dochází u nich k výraznější manifestaci pozitivních a negativních příznaků, je zde předpoklad vyššího využití zdravotnických služeb, včetně opakované a delší hospitalizace v důsledku relapsu onemocnění, které přispívají k vyšším nákladům na zdravotní péči a k nižší kvalitě života²⁴.

Terapie CRS není v současné době uspokojivě zvládnuta a velice často jsou zkoušeny nové a odlišné strategie léčby těchto pacientů. Nejčastějším přístupem je augmentace efektu klozapinu, a to zavedením další psychotropní látky^{24, 25}. Vedle antipsychotik zejména 2. generace, antidepresiv a stabilizátorů nálad se využívá i efektu elektrokonvulzivní a kognitivně-behaviorální terapie. Výsledky nejsou prozatím jednoznačné^{24, 26}. Přes nedostatek publikovaných klinických důkazů, jsou i mírné přínosy augmentačních strategií považovány za prospěšné vzhledem k rozšířenému nepříznivému dopadu CRS^{27–29}.

Novější možnost augmentace představují dlouhodobě působící injekční antipsychotika (LAI APs). Tato možnost augmentačního přístupu vychází všeobecně z časté nonadherence pacientů se schizofrenií k antipsychotické medikaci, konkrétně při terapii klozapinem se setkáváme se zdokumentovanou nonadherencí u 10–55 % pacientů^{30–34}.

LAI APs jsou depotní parenterální lékové formy, které byly vyvinuty s cílem zajistit terapii pacientů se schizofrenií a snížit riziko relapsu. V klinické praxi máme zástupce z 1. i 2. generace antipsychotik (např. haloperidol dekanoát, paliperidon palmitát, aripiprazol monohydrát)³⁵. LAI APs jsou v rámci různých odborných doporučení uvedena jako terapeutická možnost u pacientů, u kterých je přítomno nebo existuje riziko nonadherence^{36, 37}. Kromě schopnosti LAI APs předejít nonadherenci, patří k dalším výhodám léčby, oproti perorálním formulacím, určitá míra komfortu. Pacient nemusí pamatovat na každodenní užívání léčiva, dochází ke snížené frekvenci dávkování a také perorální polyfarmacie. Z pohledu lékaře se pak jedná o včasnou identifikaci nonadherence¹³. Dále bylo popsáno, že LAI APs současně snižují počet hospitalizací a využití zdravotní péče, zlepšují také kvalitu života^{35, 38–40}.

Využití depotních formulací antipsychotik k augmentaci klozapinu se nabízí zejména u nonadherentních pacientů. Doposud jsou publikované zkušenosti z augmentačního podání v rámci jednotlivých kazuistik a sérií pacientů a jejich retrospektivního zhodnocení^{41–46}, k dispozici jsou i zrcadlové typy studií^{13, 47–49}. Z těchto dosavadních publikačních výsledků vyplývá, že kromě snížení míry nonadherence může augmentace klozapinu pomocí LAI APs hrát roli ve zvýšení odpovědi klozapinu u CRS, objevuje se nižší riziko relapsů a snížený počet a délka hospitalizací. Kombinace klozapinu s LAI APs vede ke snížení tendence k agresivnímu chování a ke snížení míry sebevražedných pokusů, pacienti také vykazují lepší schopnost sociálního fungování. Výsledky augmentace klozapinu LAI APs naznačují, že k dosažení efektu v terapii je potřeba nižších dávek obou léčiv, což je příznivá informace z pohledu možného výskytu nežádoucích účinků²⁴.

Dle přehledu klinických dat^{13, 41–49} i dostupného review²⁴, můžeme zhodnotit, že panuje zájem odborné veřejnosti o shromáždění dalších klinických důkazů o významu augmentace klozapinu pomocí LAI APs u pacientů s CRS.

Klinická studie

Předkládáme retrospektivní zhodnocení kazuistik pacientů se schizofrenií, kteří měli v medikaci augmentaci klozapinu pomocí LAI APs.

Cílem bylo zhodnocení bezpečnosti a účinnosti kombinace klozapinu a LAI APs u pacientů s diagnózou schizofrenie nebo schizoafektivní porucha. Pro analýzu dat byly použity lékařské záznamy pacientů hospitalizovaných v České republice na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno (PK FN Brno) v letech 2016–2020.

Studovaná populace pacientů

Do studie byli zařazeni pacienti splňující kritéria definovaná na začátku sběru dat. Sběr dat probíhal na PK FN Brno, v České republice, na Oddělení pro terapii psychotických poruch. Ze všech pacientů hospitalizovaných v letech 2016–2020 byl vybrán soubor pacientů, kteří měli v lékové anamnéze klozapin. V dalším kroku byli z tohoto souboru vybráni pouze pacienti, kteří měli v lékové anamnéze klozapin a LAI APs.

Přesný souhrn vylučovacích kritérií:

- hospitalizace na Oddělení pro terapii psychotických poruch krajské nemocnice pouze mimo roky 2016 až 2020
- léková anamnéza neobsahující klozapin a LAI APs
- klozapin a LAI APs v lékové anamnéze, **ale ne současně**
- nepřítomnost diagnózy schizofrenie a schizoafektivní porucha
- nejasná diagnóza
- věk při poslední hospitalizaci nižší než 18 let, nebo vyšší než 60 let

Kritéria retrospektivního posouzení splňovalo celkem 15 pacientů, kteří byli zařazeni do konečného souboru pacientů. Od těchto pacientů byly získány zdravotní záznamy, které sloužily ke zpracování 15 kazuistik.

Analýza dat

Ke zpracování kazuistik byly poskytnuty řešitelům záznamy pacientů v anonymizované podobě na základě výzkumné spolupráce Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (FaF MU Brno) a PK FN Brno.

Všechna potřebná data byla extrahována z elektronického zdravotního záznamu FN Brno a přenesena do textového editoru MS Word 2020. Takto získané záznamy v anonymní podobě byly zpracovány řešitelem z FaF MU Brno do kazuistik.

Záznamy pacientů byly zkoumány zpětně, aby se získal dojem o celkovém klinickém efektu augmentačního přístupu. Byly také použity ke zjištění nežádoucích účinků kombinační terapie a jejich vyhodnocení.

Kazuistiky byly vypracovány dle následujícího schématu: krátký úvod o pacientovi, jeho konečná diagnóza a věk při poslední hospitalizaci, rodinná anamnéza, osobní anamnéza a chronologicky seřazené jednotlivé hospitalizace pacienta. V kazuistikách je pak následně uvedena poslední známá hospitalizace pacienta.

Kazuistiky byly seřazeny vzestupně podle roku poslední hospitalizace od roku 2016 po rok 2020, k jednotlivým kazuistikám byla vzestupně přidělena čísla, byly zpracovány anonymně, bez údajů jasně identifikujících daného pacienta – data byla zpracovávána bez jména, adresy, rodného čísla.

V rámci práce byly zpracovány tabulky s lékovou anamnézou pacienta. Na konci kazuistiky bylo vypracováno krátké shrnutí.

Pro zpracování kazuistik nebyl použit obsah lékových záznamů, který neměl význam pro sledované parametry, popř. byly odstraněny gramatické nepřesnosti a došlo k úpravě textu.

Vývojový diagram procesu výběru je znázorněn na obrázku 1.

Demografické údaje, zastoupení konečných diagnóz, délka léčby s konečnou diagnózou, předcházející antipsychotická léčba, LAI APs použité v rámci augmentačního přístupu, klinická manifestace nežádoucích účinků a zaznamenaný terapeutický efekt byly tabulkově zpracovány. Tato data se stala podkladem pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinace klopazinu a LAI APs a také dalších souvisejících výstupů.

Byly zjištěny základní statistické parametry (medián, směrodatná odchylka), výsledky byly zpracovány tabulkově, parametr účinnosti byl graficky vyjádřen.

Výsledky

V rámci retrospektivního srovnání splnilo kritéria pro zařazení celkem 15 pacientů, u kterých došlo k vypracování kazuistik dle výše uvedeného schématu, a byl zpracován lékový profil.

Primárním výsledkem našeho zhodnocení série případů bylo posouzení účinnosti kombinací terapie klopazinu a LAI APs v rámci sledovaného období (2016–2020), tedy zda u pacientů po nasazení augmentační strategie došlo k relapsu akutních psychotických příznaků a byli/nebyli hospitalizováni.

Současně, pokud v zdravotních záznamech byla zaznamenána hospitalizace, bylo posouzeno, z jakého důvodu došlo k výskytu relapsu onemocnění. Zda pacienti relabovali z důvodu pokračující nonadherence, došlo k relapsu z důvodu abúzu návykových látek

anebo augmentace byla z neznámých důvodů ukončena.


Sekundárním výsledkem sledování bylo zjistit profil pozorovaných nežádoucích účinků augmentační strategie se zaměřením na míru výskytu krevní dyskrázie v podobě, která vedla k nutnému přerušení kombinací léčby.

Demografická charakteristika

V rámci posuzovaného vzorku 15 pacientů převažovali muži 60 % (n = 9), průměrný věk účastníků byl 39,07 let (\pm SD 9,05) s rozmezím mezi 20–53 lety (max. = 53, min. = 20, nejvíce byli zastoupeni pacienti ve věkové kategorii 31–40 let, osm pacientů). U pacientů převažovalo středoškolské vzdělání, většina pacientů je nezaměstnaných a pobírá invalidní důchod. Demografické údaje pacientů jsou uvedeny v tabulce 1.

Klinická data

Ze souboru 15 pacientů převažovali pacienti s diagnózou paranoidní schizofrenie, jednalo se o 86,7 % pacientů (n = 13). U jednoho pacienta byla diagnostikována katatonní schizofrenie a jeden pacient trpěl schizoafektivní poruchou. Průměrná délka antipsychotické terapie před zahájením augmentační strategie byla u pacientů v našem souboru 10,7 let (medián 9 let, \pm SD 7,1), nejvíce pacientů bylo zastoupeno v kategorii 1–5 let, jednalo se celkem o pět pacientů.



Obr. 1. Vývojový diagram procesu výběru

Pacienti mající kombinaci klozapinu a LAI APs odpovídali ve 13 případech (86,7 %) schizofrenii farmakorezistentní k léčbě. TRS byla zpětně posouzena/ověřena na základě lékové anamnézy zpracované pro každého pacienta tabulkově, vyplývající ze zpracovaných kazuistik. U kazuistiky 4 byla volena kombinace depotního risperidonu z důvodu nonadherence pacienta k užívání léčiv a klozapinu zejména pro antiagresivní působení. U případu 15 není dostatečně znám lékový

profil před zahájením augmentační strategie. TRS nebylo možné posoudit. Pacientka byla před nasazením augmentace cca 14 let léčena s diagnózou paranoidní schizofrenie, docházelo u ní k opakovaným hospitalizacím.

Noncompliantní přístup k užívání léčiv byl jako důvod nasazení LAI APs volen celkově u 13 pacientů, tedy opět u 86,7 % pacientů.

Klinické údaje pacientů jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 1. Demografické údaje pacientů

Pacient	Věk*	Pohlaví	Dosažené vzdělání	Stav zaměstnání**
1	41	muž	středoškolské	?
2	35	muž	středoškolské	?
3	33	muž	středoškolské	ZM
4	31	muž	středoškolské	NZ
5	53	muž	?	?
6	47	žena	středoškolské	NZ(ID)
7	40	muž	vysokoškolské	NZ(ID)
8	34	muž	středoškolské	NZ(ID)
9	53	žena	vysokoškolské	NZ(ID)
10	32	muž	středoškolské	NZ(ID)
11	50	muž	základní	NZ(ID)
12	38	žena	vysokoškolské	NZ(ID)
13	37	žena	vysokoškolské	?
14	20	žena	?	?
15	42	žena	vysokoškolské	NZ(ID)

*Věk je stanoven k datu poslední hospitalizace.

**ZM – zaměstnaný, NZ – nezaměstnaný, ID – invalidní důchod, ? – údaj neznámý

Tab. 2. Klinické údaje pacientů

Pacient	Diagnóza	Antipsychotická terapie v letech před začátkem augmentace	TRS*	Noncompliantní přístup k užívání léčiv
1	PS	14	✓	✓
2	PS	5	✓	✓
3	PS	4	✓	✓
4	PS	2	–	✓
5	PS	24	✓	–
6	PS	8	✓	✓
7	PS	12	✓	✓
8	PS	7	✓	✓
9	KS	3	✓	✓
10	SP	9	✓	✓
11	PS	24	✓	✓
12	PS	18	✓	–
13	PS	12	✓	✓
14	PS	5	✓	✓
15	PS	14	–	✓

PS – paranoidní schizofrenie, KS – katatonní schizofrenie, SP – schizoafektivní porucha

*U pacientů došlo k nepřiměřené odpovědi na ≥ dva různé neklozapinové antipsychotické léky jak z 1., tak 2. generace, každé užívané v přiměřené dávce a délce trvání, přičemž bylo zajištěno dodržování medikace⁴⁾.

Posouzení účinnosti kombinační terapie klopapinu a LAI APs


Cílem terapie schizofrenie je vymizení psychotických příznaků onemocnění, prevence relapsu a navrácení pacienta do běžného života, tedy umožnění fungování v sociální i pracovní sféře. U farmakorezistentních pacientů je navození remise většinou komplikované^{50,51}.

K posouzení účinnosti augmentačního přístupu jsme retrospektivně hodnotili, zda ve sledovaném období

(2016–2020) po nasazení kombinace klopapinu a LAI APs došlo u pacientů ke stabilizaci stavu, pacienti byli propuštěni do ambulantní péče a nebyl zaznamenán relaps psychotických příznaků onemocnění/opětovná hospitalizace a změna medikace.

Dále byla zhodnocena předchozí zkušenost s podáním LAI APs. V tabulce 3 jsou také uvedena konkrétní LAI APs použita v rámci augmentační strategie.

Pacienti měli ve většině případů zkušenost s podáním depotní lékové formy před nasazením kombinace



Obr. 2. Výsledky augmentační strategie

Tab. 3. Výstupy z retrospektivního posouzení augmentační strategie

Pacient	Předchozí terapie LAI APs	LAI APs použita v rámci augmentace	Stabilizace stavu/relaps onemocnění	Pokračovala augmentace po poslední hospitalizaci?
1	✓	flupentixol	stabilizace	ano
2	✓	haloperidol	stabilizace	ano
3	✓	zuclopentixol	stabilizace	ano
4	–	risperidon	stabilizace	ano
5	✓	zuclopentixol	stabilizace	ano
6	✓	flupentixol	stabilizace	ano
7	✓	risperidon	relaps z důvodu abúzu návykových látek	ano
8	–	paliperidon	stabilizace	ano
9	–	flupentixol haloperidol	relaps v důsledku nonadherence	ne
10	✓	flupentixol	relaps v důsledku nonadherence	ne
11	✓	paliperidon	stabilizace (s přetrvávajícími kognitivními příznaky)	ano
12	–	zuclopentixol	stabilizace	ano
13	–	flufenazin	augmentace z neznámého důvodu ukončena	ne
14	–	paliperidon	stabilizace	ano
15	✓	flupentixol	augmentace z neznámého důvodu ukončena	ne

klozapinu a LAI APs, a to zejména z důvodu časté nonadherence k léčbě. K nejčastějším LAI APs nasazených v rámci poslední známé augmentační strategie patřil flupentixol dekanóát.

Ve většině případů byli pacienti po sledované období stabilní bez zaznamenané opětovné hospitalizace/relapsu onemocnění (n = 10, 66, 7 % případů). U jednoho případu (č. 7) je popisován abúzus marihuany, kdy v průběhu augmentace došlo k prohloubení psychotických a hypomanických příznaků, pacient musel podstoupit detoxifikační pobyt, augmentační strategie mu byla ale následně ponechána. V jednom případě (č. 9) se v průběhu augmentace objevovala častá nonadherence, která vedla k relapsům onemocnění, augmentace byla nakonec ukončena z důvodu výskytu neutropenie. U kazuistiky 13. byl flufenazin dekanóát podáván pouze po krátkou dobu, vysazen byl ambulantně z neznámého důvodu, pacient byl následně hospitalizován pro další relapsy onemocnění. U případu č. 15 byla také augmentace z neznámého důvodu ukončena, při následných hospitalizacích nebyla již použita. Výsledky augmentační strategie ukazuje graf na obrázku 2.

Z našeho souboru pacientů (n = 15) více než polovina zůstala po sledované období stabilní (n = 10), 13,3 % pacientů (n = 2) relabovalo z důvodu pokračující nonadherence, u jednoho pacienta došlo k relapsu z důvodu pokračujícího abúzu návykových látek a u dvou pacientů byla augmentace ukončena z neznámého důvodu.

Nežádoucí účinky pozorované během sledování pacientů

V rámci našeho souboru pacientů jsme sledovali míru výskytu nežádoucích účinků, pozorované nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce 4.

Nežádoucí účinky spojené s monoterapií klozapinem pozorované před augmentací

Klozapin byl ve většině případů podáván již před zahájením augmentačního přístupu. V rámci našeho sdělení uvádíme i přehled nežádoucích účinků, které byly spojené právě s podáním klozapinu v monoterapii.

S podáním klozapinu se vyskytla farmakologicky řešitelná tachykardie (n = 4; 26,7 % případů), která byla залéčena ve všech případech metoprololem a nebyla důvodem pro vysazení klozapinu. Ve dvou případech (n = 2; 13 % případů) byla pozorována obstipace, která byla залéčena laxativy. V jednom případě (6,7 % případů) byla popsána v úvodu terapie počáteční únava. V případě č. 9 byla již v úvodu terapie, následně i při dalších hospitalizacích, pozorována neutropenie, která však nebyla důvodem pro ukončení medikace v rámci monoterapie klozapinem.

Nežádoucí účinky související se strategií augmentace

U našeho souboru pacientů jsme hodnotili míru výskytu nežádoucích účinků, které se objevily během aug-

Tab. 4. Pozorované nežádoucí účinky v souboru pacientů

Pacient	Nežádoucí účinky spojené s monoterapií klozapinem před augmentací	Nežádoucí účinky související s augmentační strategií	Výskyt závažných nežádoucích účinků
1	–	–	–
2	tachykardie (podán metoprolol)	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–
6	–	–	–
7	mírná tachykardie (podán metoprolol) a počáteční únava	–	–
8	mírná trombocytopenie (podán přechodně pyridoxin a kyselina listová)	–	–
9	v úvodu terapie – přechodný pokles neutrofilů (samovolně se upravil), při další aplikaci kolísavé hodnoty leukocytů a neutrofilů (podány vitamíny skupiny B a C)	neutropenie (podán pyridoxin a kyselina listová)	✓
10	obstipace (laxativa)	–	–
11	–	–	–
12	obstipace (laxativa)	–	–
13	tachykardie (podán metoprolol)	–	–
14	tachykardie (podán metoprolol), mírný pokles v krevním obraze (podán pyridoxin a thiamin)	sinusová tachykardie (podán ivabradin)	–
15	–	–	–

mentace, abychom posoudili bezpečnost této kombinace léčiv u sledované skupiny pacientů. Zejména nás zajímalo potencionální riziko výskytu život ohrožujících nežádoucích účinků.

Z tabulky 4 vyplývá, že pouze u jednoho pacienta byla zjištěna neutropenie vedoucí k ukončení augmentační strategie – 6,7 % pacientů.

U tohoto pacienta (č. 9) se neutropenie objevila již před začátkem augmentace, kdy se v úvodu terapie samotným klozapinem samovolně upravila, v dalším průběhu terapie se ovšem objevily kolísavé hodnoty leukocytů a neutrofilů, což bylo zaléčeno vitaminy skupiny B a C. Po nasazení konkrétně kombinace klozapinu a depotního haloperidolu byla při kontrolních odběrech zjištěna neutropenie, do medikace byl nasazen pyridoxin a kyselina listová. Stav pacienta se postupně zlepšil, byl propuštěn do ambulantní péče. Následně byl ale klozapin ambulantně vysazen pro neutropenii a nasazen byl nově olanzapin.

Jako další nežádoucí účinek v souvislosti s augmentací byla zjištěna sinusová tachykardie (č. 15), která byla zaléčena podáním ivabradinu. Tachykardie se v tomto konkrétním případě objevovala i při předchozí monoterapii klozapinem. Tachykardie nebyla důvodem pro vysazení kombinační léčby.

Diskuse

Z dostupných antipsychotik klozapin zaujímá nezastupitelné místo v terapii farmakorezistentní schizofrenie. Nabízí řešení pro pacienty, u kterých léčba jinými antipsychotiky nepřináší dostatečnou klinickou odpověď. V rámci naší práce jsme retrospektivně hodnotili účinnost a bezpečnost podání kombinace klozapinu a LAI APs. Vycházeli jsme z lékařských záznamů poskytnutých v anonymizované podobě, které sloužily jako předloha pro zhotovení kazuistik dle předem určeného schématu.

Na základě údajů z kazuistik byla posouzena účinnost augmentační strategie. U nadpoloviční většiny pacientů bylo dosaženo stabilizace stavu bez opětovné hospitalizace ve sledovaném období. Naše výsledky odpovídají doposud publikovaným výsledkům.

Z pohledu bezpečnosti klozapinu z dosavadních zkušeností vyplývá, že díky rozsáhlému receptorovému působení je spojena terapie klozapinem s řadou nežádoucích účinků. Je známo, že přibližně 17 % pacientů užívajících klozapin nakonec léčbu přeruší⁽⁵²⁾. K nejčastěji publikovaným nežádoucím účinkům klozapinu, objevujících se během prvních 3 měsíců terapie, náleží sedace, únava, neklid, závratě, hypersalivace, přírůstek hmotnosti, tachykardie, bolest hlavy, zácpa a zmatenost. Tyto nežádoucí účinky jsou většinou přechodné nebo farmakologicky řešitelné. Mezi vzácné, ale život ohrožující nežádoucí účinky, patří agranulocytóza, myokarditida, neutropenie, Steven-Johnsonův syndrom, kardiomyopatie a perikarditida. Neutropenie a agranulocytóza, které se objevují především během prvních 4 měsíců terapie, jsou častým důvodem k vysa-

zení klozapinu. Užívání klozapinu je tedy spojeno s povinným hematologickým vyšetřením, aby se vyloučilo riziko krevní dyskrázie⁽⁵³⁾. Klozapin naopak vykazuje nízký sklon k extrapyramidovým vedlejším účinkům a nezvyšuje sérový prolaktin nebo hladiny kortikotropinu⁽⁵⁴⁾.

Při předcházejícím podání klozapinu jsme v našem souboru pacientů pozorovali často tachykardii, která byla ve všech případech úspěšně farmakologicky vyřešena. U dvou pacientů se objevila obstipace, která byla vyřešena podáním laxativ. V souvislosti s podáním klozapinu se ve třech případech objevil mírný pokles v krevním obraze, tento nežádoucí účinek byl úspěšně stabilizován podáním pyridoxinu a kyseliny listové, popř. pyridoxinu a thiaminu. Naše zjištění jsou v souladu s odbornou literaturou, neboť jsme u našeho souboru pacientů pozorovali nežádoucí účinky, které náležejí k nejčastěji se vyskytujícím.

Stěžejní z pohledu zhodnocení bezpečnosti našeho podání byl výskyt nežádoucích účinků způsobených kombinační léčbou. V přímé souvislosti se vyskytly u dvou případů. Pouze u jednoho pacienta se objevila neutropenie, během augmentace nedošlo k adekvátní úpravě hematologických parametrů, proto byla nakonec kombinační terapie ukončena. V dalším případě se jednalo o farmakologicky řešitelnou tachykardii, která nebyla důvodem k ukončení terapie.

Lze zhodnotit, že podání kombinace klozapinu a LAI APs se jeví u většiny pacientů v rámci našeho souboru kazuistik jako účinné a bezpečné. Z důvodu neutropenie došlo k ukončení augmentace pouze u jednoho pacienta. V rámci augmentační strategie po poslední zaznamenané hospitalizaci pokračovalo v terapii celkem jedenáct pacientů z celkového počtu 15.

Jelikož se jedná o retrospektivní zhodnocení kazuistik, jsou nám známy limity takového posouzení účinnosti a bezpečnosti z důvodu absence zhodnocení statistické významnosti našich zjištění. Hodnotíme účinnost a bezpečnost na základě výskytu nebo absence posuzovaného jevu a míry jejich zastoupení v rámci sledovaného období. Sdělení ve formě zhodnocení série pacientů má tedy popisný charakter a je založeno zejména na tabulkovém zpracování získaných výsledků. Limitem je také krátký časový úsek hodnocení, pro vyšší vypovídací hodnotu našich výsledků by bylo nutné dlouhodobější sledování pacientů s přesnou komparací stavu před a na konci terapie.

I přes limity našeho zpracování výsledná data ukazují na podání klozapinu s LAI APs jako na možný terapeutický přístup u pacientů dostatečně neodpovídajících na léčbu klozapinem s častou noncompliancí k léčbě. V současné době máme na mezinárodní úrovni publikované v tomto ohledu zrcadlové typy studií, v podmínkách České republiky jsou publikovaná data tohoto typu zatím omezená, a proto má tento charakter sdělení i tak potřebnou vypovídací hodnotu. Nicméně je nutné zdůraznit, že tento terapeutický přístup by měl být podán pouze po důkladném zvážení dosavadní terapie, a tedy striktně individualizovaný, vázaný

na dostatečnou odbornou zkušenost ošetřujícího lékaře, popř. klinického farmaceuta.

Střet zájmů: žádný.

Literatura

1. **Jauhar S., Johnstone M., McKenna P. J.** Schizophrenia. *Lancet* 2022; 399(10323), 473–486. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01730-X
2. **World Health Organization.** Schizophrenia. WHO website. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia> (10. 1. 2022).
3. **Haddad P. M., Correll C. U.** The acute efficacy of antipsychotics in schizophrenia: a review of recent meta-analyses. *Ther. Adv. Psychopharmacol.* 2018; 8, 303–318.
4. **Kane J. M., Agid O., Baldwin M. L., Howes O., Lindenmayer J. P., Marder S., Olfson M., Potkin S. G., Correll C. U.** Clinical guidance on the identification and management of treatment-resistant schizophrenia. *J. Clin. Psychiatry* 2019; 80(2), 18com12123.
5. **Taylor D. M.** Clozapine for Treatment-Resistant Schizophrenia: Still the Gold Standard? *CNS Drugs* 2017; 31, 177–180. doi: 10.1007/s40263-017-0411-6
6. **Faden J.** Treatment-Resistant Schizophrenia: A Brief Overview of Treatment Options. *J. Clin. Psychiatry* 2019; 80(4), 18ac12394. doi: 10.4088/JCP.18ac12394
7. **Crilly J.** The history of clozapine and its emergence in the US market: a review and analysis. *Hist. Psychiatry* 2007; 18(1), 39–60. doi: 10.1177/0957154X07070335. PMID: 17580753.
8. **Griffith R. W., Saameli K.** Letter: Clozapine and agranulocytosis. *Lancet* 1975; 2(7936), 657. doi: 10.1016/S0140-6736(75)90135-x. PMID: 52022.
9. **Kane J., Honigfeld G., Singer J., Meltzer H.** Clozapine for the treatment-resistant schizophrenic. A double-blind comparison with chlorpromazine. *Arch. Gen. Psychiatry* 1988; 45, 789–796. doi: 10.1001/archpsyc.1988.01800330013001
10. **Meltzer H. Y., Alphas L., Green A. I., Altamura A. C., Anand R., Bertoldi A., Bourgeois M., Chouinard G., Islam M. Z., Kane J., Krishnan R., Lindenmayer J. P., Potkin S.** International Suicide Prevention Trial Study Group. Clozapine treatment for suicidality in schizophrenia: International Suicide Prevention Trial (InterSePT). *Arch. Gen. Psychiatry* 2003; 60(1), 82–91. doi: 10.1001/archpsyc.60.1.82. Erratum in: *Arch. Gen. Psychiatry* 2003; 60(7), 735.
11. **Leucht S., Corves C., Arbter D., Engel R. R., Li C., Davis J. M.** Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. *Lancet* 2009; 373(9657), 31–41. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61764-X
12. **World Health Organization.** Model List of Essential Medicines – 22nd List, 2021. Geneva: World Health Organization; 2021 (WHO/MHP/HPS/EML/2021.02). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
13. **Grimminck R., Oluboka O., Sihota M., Rutherford D. L., Yeung H.** Combination of Clozapine With Long-Acting Injectable Antipsychotics in Treatment-Resistant Schizophrenia: Preliminary Evidence From Health Care Utilization Indices. *Prim. Care Companion CNS Disord.* 2020; 22(4), 19m02560. doi: 10.4088/PCC.19m02560. PMID: 32678523
14. **Friedman J. H., Lannon M. C.** Clozapine-responsive tremor in Parkinson's disease. *Mov. Disord.* 1990; 5, 225–229.
15. **Bonuccelli U., Ceravolo R., Salvetti S., D'Avino C., Del Dotto P., Rossi G., Murri L.** Clozapine in Parkinson's disease tremor. Effects of acute and chronic administration. *Neurology* 1997; 49, 1587–1590.
16. **Trosch R. M., Friedman J. H., Lannon M. C., Pahwa R., Smith D., Seeberger L. C., O'Brien C. F., LeWitt P. A., Koller W. C.** Clozapine use in Parkinson's disease: a retrospective analysis of a large multicentered clinical experience. *Mov. Disord.* 1998; 13, 377–382.
17. **Psychosis and schizophrenia in adults.** The NICE guideline on treatment and management – Updated edition 2014 [online]. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg178/evidence/full-guide-line-490503565>. (4. 5. 2023).
18. **Myles N., Myles H., Xia S., Large M., Kisely S., Galletly C., Bird R., Siskind D.** Meta-analysis examining the epidemiology of clozapine-associated neutropenia. *Acta Psychiatr. Scand.* 2018; 138(2), 101–109. doi: 10.1111/acps.12898
19. **Couchman L., Morgan P. E., Spencer E. P., Flanagan R. J.** Plasma clozapine, norclozapine, and the clozapine:norclozapine ratio in relation to prescribed dose and other factors: data from a therapeutic drug monitoring service, 1993–2007. *Ther. Drug Monit.* 2010; 32(4), 438–447. doi: 10.1097/FTD.0b013e3181dad1fb
20. **Yaw T. K., Fox S. H., Lang A. E.** Clozapine in Parkinsonian Rest Tremor: A Review of Outcomes, Adverse Reactions, and Possible Mechanisms of Action. *Mov. Disord. Clin. Pract.* 2015; 3(2), 116–124. doi: 10.1002/mdc3.12266
21. **de Berardis D., Rapini G., Olivieri L., Di Nicola D., Tomasetti C., Valchera A., Fornaro M., Di Fabio F., Perna G., Di Nicola M., Serafini G., Carano A., Pompili M., Vellante F., Orsolini L., Martinotti G., Di Giannantonio M.** Safety of antipsychotics for the treatment of schizophrenia: a focus on the adverse effects of clozapine. *Ther. Adv. Drug Saf.* 2018; 9(5), 237–256. doi: 10.1177/2042098618756261
22. **Siskind D., Siskind V., Kisely S.** Clozapine Response Rates among People with Treatment-Resistant Schizophrenia: Data from a Systematic Review and Meta-Analysis. *Can. J. Psychiatry* 2017; 62(11), 772–777. doi: 10.1177/0706743717718167
23. **Roerig J. L.** Clozapine augmentation strategies. *Ment. Health Clin.* 2019 Nov 27; 9(6), 336–348. doi: 10.9740/mhc.2019.11.336
24. **Chakrabarti S.** Clozapine resistant schizophrenia: Newer avenues of management. *World J. Psychiatry* 2021; 11(8), 429–448. doi: 10.5498/wjp.v11.i8.429
25. **Muscatello M. R., Bruno A., de Fazio P., Segura-Garcia C., Pandolfo G., Zoccali R.** Augmentation strategies in partial responder and/or treatment-resistant

- schizophrenia patients treated with clozapine. *Expert Opin. Pharmacother.* 2014; 15(16), 2329–2345. doi: 10.1517/14656566.2014.956082
26. **Buckley P., Miller A., Olsen J., Garver D., Miller D. D., Csernansky J.** When symptoms persist: clozapine augmentation strategies. *Schizophr. Bull.* 2001; 27(4), 615–628. doi: 10.1093/oxfordjournals.schbul.a006901
 27. **de Berardis D., Fornaro M., Anastasia A., Vellante F., Valchera A., Cavuto M., Perna G., Di Nicola M., Serafini G., Carano A., Pompili M., Orsolini L., Tomasetti C., Di Emidio G., Martinotti G., Di Giannantonio M.** When clozapine fails: Augmentation strategies in the management of clozapine-resistant schizophrenia. In: Kim Y. K. (Eds.) *Treatment resistance in psychiatry*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019; 349–367. doi: 10.1007/978-981-10-4358-1_23
 28. **Bartoli F., Crocamo C., Di Brita C., Esposito G., Tabacchi T. I., Verrengia E., Clerici M., Carrà G.** Adjunctive second-generation antipsychotics for specific symptom domains of schizophrenia resistant to clozapine: A meta-analysis. *J. Psychiatr. Res.* 2019; 108, 24–33. doi: 10.1016/j.jpsychires.2018.11.005
 29. **Miyamoto S., Jarskog L. F., Fleischhacker W. W.** Schizophrenia: when clozapine fails. *Curr. Opin. Psychiatry* 2015; 28, 243–248. doi: 10.1097/YCO.0000000000000159
 30. **Davis M. C., Fuller M. A., Strauss M. E., Konicki P. E., Jaskiw G. E.** Discontinuation of clozapine: a 15-year naturalistic retrospective study of 320 patients. *Acta Psychiatr. Scand.* 2014; 130, 30–39. doi: 10.1111/acps.12233 [Epub 2013 Dec 2].
 31. **Krivoy A., Malka L., Fischel T., Weizman A., Valevski A.** Predictors of clozapine discontinuation in patients with schizophrenia. *Int. Clin. Psychopharmacol.* 2011; 26(6), 311–315. doi: 10.1097/YIC.0b013e32834ab34c
 32. **Legge S. E., Hamshere M., Hayes R. D., Downs J., O'Donovan M. C., Owen M. J., Walters J. T. R., MacCabe J. H.** Reasons for discontinuing clozapine: A cohort study of patients commencing treatment. *Schizophr. Res.* 2016; 174(1–3), 113–119. doi: 10.1016/j.schres.2016.05.002
 33. **Pai N. B., Vella S. C.** Reason for clozapine cessation. *Acta Psychiatr. Scand.* 2012; 125(1), 39–44. doi: 10.1111/j.160leucht0-0447.2011.01776.x
 34. **Taylor D. M., Douglas-Hall P., Olofinjana B., Whiskey E., Thomas A.** Reasons for discontinuing clozapine: matched, case-control comparison with risperidone long-acting injection. *Br. J. Psychiatry* 2009; 194(2), 165–167. doi: 10.1192/bjpp.108.051979
 35. **Leucht C., Heres S., Kane J. M., Kissling W., Davis J. M., Leucht S.** Oral versus depot antipsychotic drugs for schizophrenia—a critical systematic review and meta-analysis of randomised long-term trials. *Schizophr. Res.* 2011; 127(1–3), 83–92. doi: 10.1016/j.schres.2010.11.020
 36. **Galletly C., Castle D., Dark F., Humberstone V., Jablensky A., Killackey E., Kulkarni J., McGorry P., Nielsen O., Tran N.** Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders. *Aust N Z J Psychiatry* 2005; 39, 1–30.
 37. **Kuipers E., Yesufu-Udechuku A., Taylor C., Kendall T.** Management of psychosis and schizophrenia in adults: summary of updated NICE guidelines 2014. *BMJ* 2014; 348, g1173.
 38. **Kishimoto T., Nitta M., Borenstein M., Kane J. M., Correll C. U.** Long-acting injectable versus oral antipsychotics in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of mirror-image studies. *J. Clin. Psychiatry* 2013; 74(10), 957–965. doi: 10.4088/JCP.13r08440
 39. **Kaplan G., Casoy J., Zummo J.** Impact of long-acting injectable antipsychotics on medication adherence and clinical, functional, and economic outcomes of schizophrenia. *Patient Prefer. Adherence* 2013; 7(7), 1171–1180. doi: 10.2147/PPA.S53795
 40. **Manchanda R., Chue P., Malla A., Tibbo P., Roy M. A., Williams R., Iyer S., Lutgens D., Banks N.** Long-acting injectable antipsychotics: evidence of effectiveness and use. *Can. J. Psychiatry* 2013; 58(Suppl 1), S5–S13S. Long-acting injectable antipsychotics: evidence of effectiveness and use.
 41. **Kim S. H., Jung D. CH., Ahn Y. M., Kim Y. S.** The combined use of risperidone long-acting injection and clozapine in patients with schizophrenia non-adherent to clozapine: a case series. *J. Psychopharmacol.* 2010; 24, 981–986. doi: 10.1177/0269881109348174
 42. **Baruch N., Das M., Sharda A., Basu A., Bajorek T., Ross C. C., Sengupta S., Larkin F., Young S.** An evaluation of the use of olanzapine pamoate depot injection in seriously violent men with schizophrenia in a UK high-security hospital. *Ther. Adv. Psychopharmacol.* 2014; 4, 186–192. doi: 10.1177/2045125314531982
 43. **Maia-de-Oliveira J. P., Nunes E. A., Ushirohira J. M., Machado-de-Sousa J. P., Bressan R. A., Hallak J. E.** Paliperidone palmitate for refractory and clozapine-resistant schizophrenia. *J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci.* 2015; 27, e14–e16. doi: 10.1176/appi.neuropsych.13120374 [Epub 2014 Dec 12].
 44. **Kasinathan J., Sharp G., Barker A.** Evaluation of olanzapine pamoate depot in seriously violent males with schizophrenia in the community. *Ther. Adv. Psychopharmacol.* 2016; 6, 301–307. doi: 10.1177/2045125316656319
 45. **Sepede G., Di Iorio G., Spano M. C., Lorusso M., Sarchione F., Santacroce R., Salerno R. M., Di Giannantonio M.** A Case of Resistant Schizophrenia Successfully Treated With Clozapine/Long-acting Injectable Aripiprazole Combination. *Clin. Neuropharmacol.* 2016; 39, 322–324. doi: 10.1097/WNF.0000000000000191
 46. **Oriolo G., Dominguez I., Fortea A., Bioque M., Bernardo M.** Combination of clozapine with paliperidone in treatment resistant schizophrenia. *Eur Neuropsychopharmacol.* 2016; 26, S536.
 47. **Souaiby L., Gauthier C., Rieu C., Krebs M. O., Advenier-Iakovlev E., Gaillard R.** Clozapine and long-acting injectable antipsychotic combination: A retrospective one-year mirror-image study. *Schizophr. Res.* 2017; 188, 89–91. doi: 10.1016/j.schres.2017.01.036
 48. **Bioque M., Parellada E., García-Rizo C., Amoretti S., Fortea A., Oriolo G., Palau P., Boix-Quintana E., Safont G., Bernardo M.** Clozapine and paliperidone palmitate

- antipsychotic combination in treatment-resistant schizophrenia and other psychotic disorders: A retrospective 6-month mirror-image study. *Eur. Psychiatry* 2020; 63, e71. doi: 10.1192/j.eurpsy.2020.72
49. **Caliskan A. M., Karaaslan M., Inanli I., Caliskan S., Arslan M., Esra Cicek I., Eren I.** The effects of adding long-acting injectable antipsychotic drugs to clozapine on relapse and hospitalization in patients with treatment-resistant schizophrenia: a mirror-image retrospective study. *Int. Clin. Psychopharmacol.* 2021; 36, 30–33.
50. **Ustohal L., Přikryl R.** Léčba rezistentní schizofrenie v praxi. *Psychiat. pro Praxi* 2009; 10(4), 176–179.
51. **Patel K. R., Cherian J., Gohil K., Atkinson D.** Schizophrenia: overview and treatment options. *P. T.* 2014; 39(9), 638–645.
52. **Brianne M., Newman M. D., William J., Newman M. D.** Rediscovering clozapine: Adverse effects develop – what should you do now? *Current Psychiatry* 2016; 15(8), 40–46, 48–49.
53. **Iqbal E., Govind R., Romero A., Dzahini O., Broadbent M., Stewart R., Smith T., Kim C. H., Werbeloff N., McCabe J. H., Dobson R. J. B., Ibrahim Z. M.** The side effect profile of clozapine in real world data of three large mental health hospitals. *PLoS One* 2020; 15(12), e0243437. doi: 10.1371/journal.pone.0243437
54. **Seppälä N.** Clozapine-clinical studies on adverse effects and interactions. Academic dissertation. Tampere: Tampere University press, 2014. Available from: <https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9565-9566> (21. 3. 2023).