

## PALATINÁNĚ DISLOKOVANÝ ŠPIČÁK A ASOCIOVANÉ DENTÁLNÍ ANOMÁLIE

Kostolányová M., Krejčí P.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

**Úvod:** Horní špičák patří k zubům, jehož vývoj v čelisti probíhá nejvzdáleněji od jeho definitivního uložení v zubním oblouku až v blízkosti nosní dutiny, a jeho erupční dráha je proto v porovnání s ostatními zuby stále dentice nejdelsí.

Jedním z etiologických faktorů retence (v tomto případě přesněji impaktace) horního špičáku je nedostatek místa v zubním oblouku či jiná forma překážky v jeho erupční dráze (nadpočetný zub, odontom aj.). Na druhou stranu ve většině případů palatinálně dislokovaných špičáků i přes dostatek místa v zubním oblouku a volné erupční dráze k jejich spontánní erupci nedochází.

Dentice pacientů s palatinálně dislokovanými špičáky je často

postižena přidruženými dentálními anomáliemi – mezi nejčastější z nich patří hypodoncie, mikrodoncie, morfologické změny postranních řezáků, infraokluze dočasných molárů, transpozice zubů či taurodontismus. Souvislost mezi hypodoncí a doprovázejícími dentálními anomáliemi na jedné straně a palatinálně dislokovanými špičáky na druhé straně je náplní výzkumu hypodoncí v širších souvislostech, především v klinických dopadech na takto postižené jednotlivce.

**Závěr:** V našem příspěvku shrneme dosavadní poznatky o klinickém obrazu dentice pacientů postižených palatinálně dislokovaným špičákem.



**NÁŠ VĚDECKÝ ČASOPIS**  
Vaše nové možnosti pro inzerci

Informace  
o inzerci v časopisu  
**ČESKÁ STOMATOLOGIE  
A PRAKTICKÉ  
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ:**  
Česká stomatologická komora

Tereza Soukupová, DiS.,  
e-mail: soukupova@dent.cz  
tel.: +420 770 134 250

Ceník inzerce:  
[www.dent.cz/komerčni-spoluprace](http://www.dent.cz/komerčni-spoluprace)  
[www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/informace](http://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/informace)