

## KONTROLNÍ TEST

**1. Mezi inhibitory IL-17 nepatří:**

- a) brodalumab
- b) ixekizumab
- c) secukinumab
- d) risankizumab

**2. Chimérická monoklonální protilátka je:**

- a) etanercept
- b) infliximab
- c) ixekizumab
- d) apremilast

**3. Léčba anti-TNF nezhoršuje průběh:**

- a) tuberkulózy
- b) srdečního selhání
- c) střevních zánětů
- d) demyelinizačního onemocnění

**4. Jaké jsou nejčastější infekční komplikace při anti-IL-17 léčbě:**

- a) kvasinkové infekce
- b) tuberkulóza
- c) hepatitida
- d) herpes zoster

**5. Apremilast je:**

- a) inhibitor Janus kinázy
- b) inhibitor fosfodiesterázy 4
- c) inhibitor tyrosinkinázy
- d) inhibitor IL-12/23

**6. Léčba anti-IL-17 může zhoršit:**

- a) Crohnovu chorobu
- b) maligní onemocnění
- c) obezitu
- d) autoimunitní thyreoiditidu

**7. Které biologikum se vyznačuje nejrychlejším nástupem účinku:**

- a) infliximab
- b) secukinumab
- c) ustekinumab
- d) brodalumab

**8. Mezi inhibitory IL-23 nepatří:**

- a) certolizumab
- b) risankizumab
- c) tildrakizumab
- d) guselkumab

**9. U kterého biologika je nejmenší pravděpodobnost transplacentárního přenosu:**

- a) adalimumab
- b) etanercept
- c) certolizumab
- d) infliximab

**10. Jaké biologikum je možné podat v nejnižší věkové hranici u dítěte s psoriázou:**

- a) etanercept
- b) adalimumab
- c) ustekinumab
- d) brodalumab

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zaslány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na e-mailovou adresu: [kozni@lf1.cuni.cz](mailto:kozni@lf1.cuni.cz) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 3/2019: Nemšovská J.: **Liekové hypersenzitívne reakcie: klasifikácia a patogenéza (1. časť)**

Správné odpovědi: **1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.d, 6.a, 7.c, 8.d, 9.b, 10.a**